

اثر درمانی کلسیم-Vit D در زنان نابارور مبتلا به سندروم تخمدارن پلی کیستیک

بتول رشیدی (M.D.)^۱، فدیه حق‌اللهی (M.Sc.)^۲، نجمه تهرانیان (Ph.D.)^۳، مامک شریعت (M.D., M.C.H.)^۱، فرید زایری (Ph.D.)^۳، مریم باقری (M.Sc.)^۱، مقصومه معصومی (B.Sc.)^۱

۱- مرکز تحقیقات بهداشت باروری و لیعصر، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی تهران، تهران، ایران.

۲- گروه فیزیولوژی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

۳- گروه آمار حیاتی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شاهد، تهران، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: سندروم تخمدارن پلی کیستیک (PCOS) مهمترین علت اولیگواولاسیون و عدم تخمک‌گذاری در زنان سینین باروری و در زنان نابارور می‌باشد. با توجه به مقاومت به انسولین و هیپرأنسولینمی در این بیماری و نقش کلسیم و ویتامین D در اصلاح اختلال ترشح انسولین و تکامل اووسیت در پستانداران، به نظر می‌رسد میزان اثربخشی کلسیم بر تخمک‌گذاری در انسان (در موارد PCOS)، از موارد مهم بررسی و مطالعه می‌باشد؛ لذا این مطالعه با هدف بررسی اثر کلسیم بر تخمک‌گذاری و اندازه فولیکول در مقایسه با درمان رایج متفورمین طراحی و اجرا شد.

روش بررسی: در این مطالعه کلیه بیماران مبتلا به سندروم PCOS (بر طبق معیار Rotterdam و تأیید تشخیص توسط پزشک متخصص) مراجعه‌کننده به درمانگاه ناباروری مرکز تحقیقات بهداشت باروری و لیعصر در سال ۱۳۸۳، پس از ابراز تمایل به همکاری در مطالعه، در سه گروه درمانی ۲۰ نفره به تفکیک تحت درمان قرار گرفتند. در گروه اول روزانه با قرص کلسیم-D^{1000mg} (Vit D^{1000mg})، گروه دوم تحت درمان با قرص کلسیم-D^{1500mg} (Vit D^{1500mg}) به همراه متفورمین (GEE^{1000mg}) و گروه سوم تحت درمان با قرص متفورمین (GEE^{1500mg}) به مدت ۳ ماه تحت درمان و ۳ ماه کنترل پس از درمان مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند. پیگیری بیماران پس از ۶ ماه به صورت بررسی اندازه فولیکول غالب، نظم قاعده‌گی و بارداری صورت پذیرفت. پس از جمع‌آوری داده‌ها و ثبت رایانه‌ای آنها در نرم افزار آماری SPSS ۱۱، آنالیز آماری بر مبنای فرضیات (آزمون کروسکال والیس، ANOVA و رگرسیون GEE) با سطح معنی‌داری ۰/۰۵ انجام شد.

نتایج: در ارتباط با پاسخ درمانی در این بیماران (اندازه فولیکول $\geq 12mm$ ، آزمون آماری GEE نشان داد فراوانی نسبی پاسخدهی رشد فولیکول در گروه کلسیم-D^{1500mg} و متفورمین به نسبت دو گروه دیگر به طور معنی‌داری در ماههای پنجم و ششم بیشتر بود ($p=0/03$).

نتیجه‌گیری: با توجه به عملکرد متفورمین به صورت کاهش و تنظیم انسولین و همچنین نقش مشخص کلسیم-D^{1500mg} در اصلاح و تنظیم انسولین در این سندروم، مصرف همزمان این دو دارو به منظور اصلاح اختلال انسولین و کاهش آنдрوروژن و در نتیجه بلوغ تخمک پیشنهاد می‌شود.

کلید واژگان: سندروم تخمدارن پلی کیستیک، کلسیم، ویتامین D، متفورمین، مقاومت به انسولین، اثر کلسیم بر انسولین، هیپرآنдрوروژنیسم.

مسئول مکاتبه: دکتر بتول رشیدی، مرکز تحقیقات بهداشت باروری و لیعصر، مجتمع بیمارستانی امام خمینی، انتهای بلوار کشاورز، تهران، ایران.

پست الکترونیک: a3064@sina.tums.ac.ir

تظاهرات عدم تخمک‌گذاری و اولیگووالاسیون و علائم شیمیایی و یا بالینی هیپرآندروژنیسم و نمای پلیکیستیک تخدان به عنوان بیماری PCOS در نظر گرفته می‌شود (در سال ۲۰۰۳ وجود ۲ مورد از ۳ مورد علائم فوق به عنوان معیار Rotterdom جزء ملاک تشخیص PCOS ارائه شده است^(۴)).

بیماران PCOS در معرض خطر دیابت، چاقی، بیماری‌های قلبی-عروقی و دیس‌لیپیدمی می‌باشند (۵-۷). مطالعه Zborowski در سال ۲۰۱۱ نشان داد که بیماران PCOS در معرض استئوپیروز (پوکی استخوان) نیز قرار دارند که این اثر می‌تواند ناشی از عملکرد انسولین در جذب کلیم و اثر هموسیستئین باشد (۸،۹). مطالعات متعدد نشان می‌دهد که متعاقب کاهش کلیم سرم، افزایش هورمون پاراتیروئید (PTH)، منجر به افزایش فشارخون می‌گردد؛ لذا مصرف کلیم می‌تواند از افزایش فشارخون و متعاقباً^۱ بیماری‌های قلبی-عروقی پیشگیری نماید (۱۰،۱۱). در ضمن تجویز کلیم و ویتامین D، سبب افزایش کلیم و کاهش قند خون می‌شود (اثر کلیم در اصلاح اختلال ترشح انسولین، نسبی و اثر ویتامین D کامل است)^(۹). با مطالعات متعدد بر روی حیوانات، نقش کلیم در تکامل تخمک نیز مشخص گردیده است، ولی چگونگی این اثربخشی ناشناخته می‌باشد و محققین لزوم اثربخشی کلیم و ویتامین D را بر تخمک‌گذاری انسان (به‌خصوص در موارد PCOS)، از موارد مهم بررسی و مطالعه می‌دانند (۱۲-۱۴).

نظر به اینکه PCOS مجموعه‌ای از علائم همراه و مقاوم به درمان می‌باشد و با توجه به عوارض دارویی درمان‌های PCOS و هزینه بالای این درمانها، لذا مطالعه‌ای با هدف بررسی اثر کلیم- D بر درمان اختلالات قاعده‌گی در بیماران مبتلا به PCOS و افزایش میزان موافقیت درمان‌های ناباروری (اثر بر تخمک‌گذاری و رشد فولیکول در مقایسه با درمان رایج متفورمین

زمینه و هدف

سندرم تخدان پلیکیستیک (PCOS)^(۱) مهمترین علت اولیگووالاسیون و عدم تخمک‌گذاری در جمعیت عمومی و در زنان نابارور می‌باشد که حدود ۶-۶٪ از جمعیت زنان را گرفتار می‌نماید. در این حالت تخدانها بزرگ شده و حاوی چندین کیست کوچک می‌باشد که با یک یا چندین نشانه شامل قاعده‌گی غیرطبیعی، افزایش موى بدن و ناباروری مشخص می‌گردد و با افزایش عوامل خطر دیابت، چاقی و فشارخون، احتمال بیماری‌های قلبی-عروقی را افزایش می‌دهد. در ضمن این افراد، دچار مقاومت به انسولین و هیپرانسولینیمی نیز می‌باشند^(۱).

مطالعات نشان داده که انسولین، دارای اثرات عمیقی در دو سطح استرومای تخدان و فولیکول است. انسولین ترشح آندروژنها را در تخدان القاء می‌کند و افزایش آندروژن به نوبه خود باعث آترزی یا تحلیل فولیکول‌های در حال رشد می‌شود و با پدیدار شدن یک فولیکول غالب تداخل پیدا می‌کند؛ بنابراین الگوهای ترشح طبیعی استروژن مختل شده و با عدم وقوع LH surge در اواسط سیکل ترشح پروژسترون در فاز فوتال وجود ندارد. با ترشح استروژن از فولیکول‌های کوچک، این بیماران هیپراستروژنیک^(۲) و هیپرآندروژنیک^(۳) شده و افزایش آندروژنها عموماً باعث کاهش تولید کبدی و ترشح گلوبولین متصل شونده به هورمون جنسی (SHBG)^(۴) می‌گردد. در زنان طبیعی نزدیک به ۹۹٪ از آندروژن در گردش به SHBG یا سایر پروتئین‌های حامل موجود در پلاسما متصل می‌باشند و هنگامی که مقادیر بالای آندروژن SHBG را سرکوب کند، تستوسترون و سایر آندروژن‌های آزاد شدیداً افزایش می‌یابد^(۱-۳).

1- Poly Cystic Ovarian Syndrome

2- Hyperestrogenic

3- Hyperandrogenic

4- Sex Hormone Binding Globulin

۱۰۰۰ mg کلسیم همراه با ۴۰۰ IU ویتامین D شرکت تهران دارو- ایران) دو بار در روز به مدت ۳ ماه، گروه دوم تحت درمان با قرص کلسیم-Vit D (روزانه ۱۰۰۰ mg کلسیم همراه با ۴۰۰ IU ویتامین-D، شرکت تهران دارو، ایران) دو بار در روز به همراه متغورمین (روزانه ۱۵۰۰ mg- شرکت دارویی مینو، ایران) سه بار در روز به مدت ۳ ماه و گروه سوم تحت درمان با قرص متغورمین (روزانه ۱۵۰۰ mg، شرکت دارویی مینو، ایران) سه بار در روز به مدت ۳ ماه قرار گرفتند.

اطلاعاتی مانند سن، طول مدت ناباروری، سابقه سیکل‌های غیرطبیعی (اولیگومنوره، آمنوره)، بررسی‌های آزمایشگاهی (PRL، LH، FSH) و کلسیم خون و ادرار) و عادات غذایی یک روز کامل توسط کارشناسان مامایی مستقر در درمانگاه از تک‌تک نمونه‌ها سئوال شد و در پرسشنامه درج گردید.

نمونه‌های هر سه گروه ماهیانه در اواسط سیکل طی مدت ۶ ماه متوالی (سه ماه تجویز دارو و سه ماه کنترل بعدی) توسط متخصص درمانگاه به منظور بررسی اندازه فولیکول غالب تخدمان، سونوگرافی واژینال شدن و نتایج دقیقاً در پروندها ثبت گردید.

اصلاح سیکل‌های قاعده‌گی (اولیگومنوره و آمنوره) با گرفتن شرح حال از بیمار (سیکل‌های منظم ماهیانه برمنای فواصل ۲۰-۳۵ روز) و تأیید بارداری با انجام تست β -hCG بررسی گردید.

سپس، داده‌ها در یک طرح سه گروهی توسط متخصص آمار با کمک آمارتوصیفی و استنباطی (آزمون فرضیه‌ها توسط آزمون χ^2 ، کروسکال- والیس و آنالیز واریانس یک طرفه) تجزیه و تحلیل آماری شد. با توجه به تکراری^۱ و رتبه‌ای^۲ بودن داده‌های متغیر وابسته (پاسخ به درمان) برای مقایسه اثر گروه‌های درمانی مختلف از روش رگرسیون چند متغیره و معادلات

طراحی و اجرا شد. امید است نتایج حاصل از این مطالعه گام مهمی در جهت درمان عوارض و اختلالات قاعده‌گی و ناباروری و همچنین پیشگیری از پوکی استخوان در این بیماران باشد.

روش بررسی

این مطالعه پژوهش تجربی از نوع کارآزمایی بالینی بود که در آن اثر یک داروی خاص بر درمان بیماری خاص در طی ۶ ماه سنجیده شد.

زنان گروه سنی ۲۰-۴۰ سال که جهت درمان ناباروری به درمانگاه ناباروری مرکز تحقیقات بهداشت باروری و لیعصر مراجعه نموده و مبتلا به PCOS (با داشتن معیار Rotterdam، شناخته شده بودند، به عنوان جامعه هدف و واحد آماری مطالعه در نظر گرفته شدند. معیار Rotterdam شامل تظاهرات عدم تخمک‌گذاری و اولیگووالاسیون، علائم شیمیایی و یا بالینی هیپرآندروژنیسم و نمای تخدمان پلی‌کیستیک است که در سال ۲۰۰۳ وجود ۲ مورد از ۳ مورد علائم فوق به عنوان ملاک تشخیص PCOS ارائه شده است (۴).

سیکل‌های غیرطبیعی قاعده‌گی (اولیگومنوره، آمنوره)، تخدمان پلی‌کیستیک در سونوگرافی، علائم شیمیایی و یا بالینی هیپرآندروژنیسم (پرموی، آکنه) به عنوان معیارهای ورود و وجود بیماری زمینه‌ای، سابقه جراحی شکم و لگن، ناباروری در مرد و هیستروسالپینگوگرافی و پرولاکتین غیرطبیعی به عنوان معیارهای خروج از مطالعه در نظر گرفته شد.

قبل از انجام مطالعه تأییدیه کیته اخلاق از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی تهران و رضایت‌نامه از نمونه‌ها اخذ شد. بیماران انتخاب شده برای مطالعه به صورت همسان‌سازی شده به صورت تصادفی ساده در سه گروه درمانی ۲۰ نفره به صورت زیر تقسیم شدند: گروه اول تحت درمان با قرص کلسیم-Vit D (روزانه

1- Repeated Measures
2- Ordinal

جدول ۱- مشخصات متغیرهای کمی (M±SD) در زنان نابارور مبتلا به PCOS مراجعه کننده به درمانگاه درمان ناباروری و لیعصر، ۱۳۸۳

متغیرهاي کمي گروهها	سن (سال)	BMI (kg/m ²)	مدت ناباروري (سال)	کلسیم سرم (mg/dl)	کلسیم ادرار (mg/dl)	FSH (mIU/ml)	LH (mIU/ml)	پرولاکتین (μg/ml)	متغیرهاي کمي
گلسیم	۲۴/۹۵±۳/۵۶	۲۵/۷۵±۳/۹۴	۰/۰۸±۲/۸۵	۹/۸۴±۰/۷۳	۱۸۶/۲۶±۸۶/۶	۰/۲۰±۱/۹۸	۹/۹۰±۲/۵۸	۲۰۰/۰/۶±۱۹۸/۷۵	D
گلسیم و متغورمین	۲۰/۸۰۰±۴/۶۱	۲۷/۸۱±۳/۷۸	۰/۰۲±۲/۷۴	۹/۴۲±۰/۷۱	۱۸۱/۷±۰/۶۴	۱۰/۲۴±۶/۲۸	۱۲/۶/۶۶±۲۲۱/۲۰	۲۱۶/۶۶±۲۲۱/۲۰	D و متغورمین
متغورمین	۲۶/۹۵±۴/۴۴	۲۵/۱۶۲±۳/۸۶۰	۰/۶۷±۲/۳۱	۹/۶۱±۱/۰۳	۲۰۰/۸۹±۹۴/۴۴	۸/۸۱±۴/۵۱	۷/۱۲±۰/۲۹	۲۳۴/۱۵۳±۲۵۹/۰۲	متغورمین
کل	۲۰/۹۱±۴/۲۳	۲۶/۱۶±۳/۹۵	۰/۰۹±۲/۲۹	۹/۶۷±۰/۸۴	۱۸۹/۸۱±۸۳/۲	۰/۲۸±۱/۷۸	۹/۶۵±۴/۹۱	۲۴۸/۸۷±۲۳۱/۰	کل
P-value (ANOVA)	۰/۳۳	۰/۱۰۸	۰/۷۷۷	۰/۲۰۶	۰/۷۳۸	۰/۴۲۸	۰/۶۴۰	۰/۱۴۵	۰/۵۲۸

کلسیم در ادرار ۲۴ ساعته در سه گروه ۱۸۹/۸۱±۸۳/۲ mg/dl بود که در طیف نرمال ۱۸۹/۸۱±۸۳/۲ mg/dl قرار داشت.

میانگین BMI بیماران ۲۶/۱۶±۳/۹۵ kg/m² بود (جدول ۱) و از نظر متغیرهای کمی در سه گروه، با انجام آزمون آماری آنالیز واریانس یکطرفه اختلاف معنی داری مشاهده نشد.

اکثر نمونه ها در هر سه گروه در ۶ ماه گذشته سابقه اولیگومنوره داشتند. به تفکیک در سه گروه به ترتیب ۲ نفر (٪۱۰)، ۵ نفر (٪۲۵) و ۲ نفر (٪۱۰) در ۶ ماه گذشته سابقه آمنوره داشتند (جدول ۲).

به منظور حذف اثر مخدوش کنندگی نوع رژیم غذایی از

بر آورد تعمیم یافته (GEE)^۱ استفاده شد.

نتایج

در این مطالعه، ۶۰ بیمار مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک در سه گروه ۲۰ نفره مطابق پروتکل اجرایی به مدت ۶ ماه بررسی شدند. میانگین سنی نمونه ها ۲۵/۹۱±۴/۲۳ سال (فاصله سنی ۱۸-۳۷ سال) و میانگین BMI ۲۶/۱۶±۳/۹۵ kg/m² بود که در فاصله ۱۶-۳۶ kg/m² قرار داشت (جدول ۱).

میانگین غلظت کلسیم خون در نمونه های سه گروه ۹/۶۲±۰/۸۴ mg/dl بود که در طیف نرمال ۸/۶-۱۰/۲ mg/dl قرار دارد، همچنین میانگین غلظت

جدول ۲- توزیع فراوانی متغیرهای کیفی در زنان نابارور مبتلا به PCOS مراجعه کننده به درمانگاه درمان ناباروری و لیعصر، ۱۳۸۳

P-value (Fisher Exact Test)	گروهها						متغیرهای کیفی										
	نوع ناباروری		اویلیه		ثانویه												
متغورمین	متغورمین	D	کلسیم-D	کلسیم	کلسیم	کلسیم	درصد	درصد	درصد	درصد	درصد	تعداد	تعداد	تعداد			
۰/۷۳۲	۸۰	۱۶	۷۵	۱۵	۸۵	۱۷	سباقه اولیکومنوره در ۶ ماه گذشته	دارد	ندارد	دارد	ندارد	۹۰	۱۸	۱۰۰			
	۲۰	۴	۲۵	۵	۱۵	۳											
۰/۱۲۶	۹۰	۱۸	۱۰۰	۲۰	۱۰۰	۲۰	سباقه آمنوره در ۶ ماه گذشته	دارد	ندارد	دارد	ندارد						
	۱۰	۲	۰	۰	۰	۰											
۰/۳۰۸	۱۰	۲	۲۵	۵	۱۰	۲	سباقه آمنوره در ۶ ماه گذشته	دارد	ندارد	دارد	ندارد						
	۹۰	۱۸	۷۵	۱۵	۹۰	۱۸											
۰/۱۰۸	۸۰	۱۶	۱۰۰	۲۰	۹۰	۱۸	سباقه اولیکومنوره در ۶ ماه گذشته	دارد	ندارد	دارد	ندارد						
	۲۰	۴	۰	۰	۱۰	۲											
۰/۱۵۳	۱۰	۲	۲۵	۵	۱۰	۲	جمع کل	دارد	ندارد	دارد	ندارد						
	۹۰	۱۸	۷۵	۱۵	۹۰	۱۸											
--	۱۰۰	۲	۱۰۰	۲۰	۱۰۰	۲۰											

1- Generalized Estimating Equation

BMI=۲۵-۲۷، آزمون های آماری $\chi^2 > 27$ ، BMI > 27 ، رگرسیون هیچ گونه رابطه معنی داری بین تنظیم سیکل های قاعده ای و همچنین پاسخ دهنده فولیکولها با BMI بیماران را نشان نداد. به عبارتی BMI پاسخ به درمان را متأثر نساخته بود. هرچند که توزیع فراوانی سیکل قاعده ای برحسب BMI نشان داد که در گروه با BMI طبیعی ($25-27 \text{ kg/m}^2$) سیکل های قاعده ای منظم بیشتر بود ($44/5\%$ در مقایسه با 32% در هر کدام از دو گروه دیگر). جدول ۴ نتایج حاصل از این تحلیل را نشان می دهد. در این جدول گروه کلسیم-D Vit به عنوان طبقه مرجع در نظر گرفته شد و دو گروه درمانی دیگر با این گروه مورد مقایسه قرار گرفت.

در ارتباط با پاسخ درمانی (اندازه فولیکول غالب) متعاقب مداخله درمانی در بیماران PCOS آنالیز رگرسیون، چند متغیره و تحلیل GEE نشان داد که بین گروه متفورمین (گروه ۳) و گروه کلسیم-D Vit بین گروه کلسیم-D (گروه ۱) از نظر رشد فولیکول اختلاف آماری معنی داری وجود ندارد.

اما بین دو گروه کلسیم-D Vit و متفورمین (گروه ۲) و گروه کلسیم-D (گروه ۱) از نظر آماری اختلاف معنی داری وجود دارد ($p=0.372$). بدین معنی که

جدول ۳- ارتباط بین تنظیم شدن سیکلهای قاعده ای متعاقب مداخله درمانی در سه گروه زنان نابارور مبتلا به PCOS مراجعه کننده به درمانگاه درمان ناباروری و لیعصر، ۱۲۸۳

		جمع کل		نامنظم		منظم		وضعیت سیکل	
		درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد
		۱۰۰	۲۰	۷۰	۱۴	۳۰	۶	Vit D	کلسیم-
		۱۰۰	۲۰	۵۰	۱۰	۵۰	۱۰	VitD و متفورمین	کلسیم-
		۱۰۰	۲۰	۶۵	۱۳	۳۵	۷	متفورمین	متفورمین

$p=0.400$, $\chi^2=0.83$

طریق پرسشنامه خصیمه تغذیه بسامد ۲۴ ساعته، فراوانی دریافت گروه میوه، لبیات، پروتئین و چربی در هر سه گروه مقایسه شد. آزمون آماری کروسکال والیس همگن بودن گروهها را از نظر نوع رژیم غذایی نشان داد. البته شایان ذکر است که دریافت کلسیم از طریق لبیات در حدود ۶۰٪ افراد کمتر از میزان توصیه شده روزانه (RDA) بود. سیکل های قاعده ای متعاقب سه ماه مداخله درمانی در گروه اول ۳۰٪، در گروه دوم ۵۰٪ و در گروه سوم ۳۵٪ منظم شده بود (جدول ۳).

آزمون χ^2 با $p=0.400$ نشان داد که اختلاف آماری معنی داری بین گروهها وجود ندارد، هرچند که در گروه کلسیم-D Vit و متفورمین، تنظیم قاعده ای به وضوح بیش از دو گروه دیگر مشاهده شد.

با تقسیم بندی BMI به سه گروه BMI=۲۵

جدول ۴- ارتباط بین پاسخ درمانی (اندازه فولیکول) متعاقب مداخله درمانی در سه گروه زنان نابارور مبتلا به PCOS مراجعه کننده به درمانگاه درمان ناباروری و لیعصر، ۱۲۸۳

		متفورمین		کلسیم-D و متفورمین		کلسیم-D		گروهها	
درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	پاسخ درمانی	
۹۵	۱۹	۷۵	۱۵	۹۵	۱۹	ندارد	ندارد	پاسخ درمانی فولیکول	در ماه سوم
۰	۰	۱۰	۲	۰	۱	حد مرزی (۱۰-۱۲mm)	دارد ($\geq 12\text{mm}$)	پاسخ درمانی فولیکول	در ماه چهارم
۵	۱	۱۵	۰	۰	۰	ندارد	ندارد	پاسخ درمانی فولیکول	در ماه پنجم
۷۵	۱۵	۶۵	۱۳	۹۵	۱۹	حد مرزی (۱۰-۱۲mm)	دارد ($\geq 12\text{mm}$)	پاسخ درمانی فولیکول	در ماه ششم
۱۰	۲	۲۵	۰	۰	۱	حد مرزی (۱۰-۱۲mm)	دارد ($\geq 12\text{mm}$)	پاسخ درمانی فولیکول	در ماه ششم
۱۵	۰	۱۰	۲	۰	۰	ندارد	ندارد	پاسخ درمانی فولیکول	در ماه ششم
۷۳/۷	۱۴	۶۰	۱۲	۸۰	۱۶	حد مرزی (۱۰-۱۲mm)	دارد ($\geq 12\text{mm}$)	پاسخ درمانی فولیکول	در ماه ششم
۲۱/۱	۴	۱۰	۲	۰	۰	حد مرزی (۱۰-۱۲mm)	دارد ($\geq 12\text{mm}$)	پاسخ درمانی فولیکول	در ماه ششم
۵/۲	۱	۳۰	۶	۲۰	۴	حد مرزی (۱۰-۱۲mm)	دارد ($\geq 12\text{mm}$)	پاسخ درمانی فولیکول	در ماه ششم
۷۸/۹	۱۵	۶۲/۲	۱۲	۷۸/۹	۱۵	ندارد	ندارد	پاسخ درمانی فولیکول	در ماه ششم
۵/۳	۱	۱۰/۵	۲	۰	۰	حد مرزی (۱۰-۱۲mm)	دارد ($\geq 12\text{mm}$)	پاسخ درمانی فولیکول	در ماه ششم
۱۵/۸	۰	۲۶/۳	۰	۲۱/۱	۴	حد مرزی (۱۰-۱۲mm)	دارد ($\geq 12\text{mm}$)	پاسخ درمانی فولیکول	در ماه ششم

جدول ۵- برآورد ضرائب مدل رگرسیون GEE در زنان نابارور مبتلا به PCOS مراجعه کننده به درمانگاه درمان ناباروری و لیعصر، ۱۲۸۳

پارامتر	برآورد	خطای معیار	Z	P	OR
عرض از مبداء ۱	-۲/۰۰	.۰/۴۱۲	-۶/۰۷	<۰/۰۰۱	--
عرض از مبداء ۲	-۱/۹۴	.۰/۴۰۸	-۴/۷۵	<۰/۰۰۱	--
گروه درمانی ۱ (متفورمین)	.۰/۴۳۳	.۰/۶۰۹	۱/۰۶	.۰/۲۹۰	۱/۵۴
گروه درمانی ۲ (کلسیم + متفورمین)	.۰/۷۰۰	.۰/۳۳۶	۲/۰۸	.۰/۰۳۷	۲/۰۱
گروه درمانی ۳ (کلسیم + ویتامین D)	--	--	طبقه مرجع	--	--

همچنین طی مطالعه‌ای نشان داده شده است که تخمک متوقف شده در مرحله میوز با افزایش cAMP داخل سلولی یا کاهش داخل سلولی کلسیم همراه بوده و سپس با افزودن یون کلسیم در محیط کشت، این توقف در رشد تخمک اصلاح شد (۲۲).

در مطالعه دیگری و راپامیل تراکائین به عنوان بلوککننده کلسیم باعث توقف بلوغ تخمک در مرحله میوز می‌گردد (۲۱).

با توجه به مطالعات انجام شده بر روی حیوانات نیز شواهدی از نقش کلسیم در بلوغ تخمک مطرح شده است (۱۵، ۱۲، ۱۳).

با توجه به شیوع کمبود ویتامین D در زنان ایرانی، به نظر می‌رسد که تجویز کلسیم-D روزانه در درمان این بیماران کمککننده باشد. زیرا تجویز کلسیم-D سبب افزایش کلسیم و کاهش قندخون می‌شود که اثر کلسیم در اصلاح اختلال ترشح انسولین نسبی و اثر ویتامین D کامل است (۹).

نتایج مطالعه حاضر نشان داد، با توجه به غلظت طبیعی کلسیم خارج سلولی و کلسیم ادراری، عملکرد PTH نیز به صورت طبیعی بوده و اختلالی در عملکرد آن وجود نداشت. همچنان که در مطالعه انجام شده توسط Yacob این افراد مشاهده گردید که در این بیماران علی‌رغم طبیعی بودن غلظت کلسیم خارج سلولی، متعاقب کاهش ویتامین D کاهش غلظت سرم کلسیم داخل سلولی و همچنین عملکرد غیرطبیعی تخمک مشاهده شد (۱۴).

گروه دوم، پاسخ درمانی مناسب‌تر و معنی‌دارتری نسبت به گروه ۱ نشان داده است. با توجه به ستون شناسه‌ها (OR)^۱ می‌توان چنین نتیجه گرفت که شناسنامه درمانی Vit D و پاسخ مناسب به درمان در متفورمین (گروه ۲) دو برابر پاسخ مناسب به درمان در گروه کلسیم-D (گروه ۱) بوده است (OR=۲/۰۱).

علاوه بر آن پاسخ مثبت به درمان در گروه مصرف‌کننده کلسیم-D در این ماهها بیش از مصرف متفورمین به تنهایی (گروه سوم) برآورد شده است؛ هرچند که آزمون‌های آماری این تفاوت را معنی‌دار نشان نداد (جدول ۴).

همچنین در هیچ یک از سه گروه متعاقب درمان، بارداری طبیعی رخ ندارد.

بحث

سندرم تخدان پائی کیستیک مهمترین علت اولیگواؤولاسیون و عدم تخمک‌گذاری در ۶-۴٪ جمعیت عمومی و بویژه زنان نابارور می‌باشد (۱). هیپرانتسولینی در این سندرم منجر به افزایش آندروژن و متعاقباً آترزی و عدم پدیدار شدن یک فولیکول غالباً می‌گردد و با توجه به اینکه بلوغ تخمک، قدم مهمی در باروری و ایجاد بارداری می‌باشد، لذا عده‌ای از محققین طی مطالعات متعددی بر روی بی‌مهرگان و دوزیستان نقش کلسیم را در بلوغ تخمک اثبات نمودند و در پستانداران نیز نقش کلسیم در بلوغ تخمک به طور قوی تأیید شده است (۱۲-۱۶).

آنdroژن موجب اصلاح سیکل‌های قاعده‌گی و ایجاد باروری در زنان گردید (۲۰).

در مطالعه حاضر با توجه به نقش کلسیم در کاهش و تنظیم انسولین (۹) و همچنین مطالعه Velazquez در ارتباط با نقش متغورمین در تنظیم انسولین خون (۲۰)، به نظر می‌رسد اثر درمانی همزمان کلسیم و متغورمین با کاهش انسولین و آندروژن، در جهت تکامل فولیکول (رشد فولیکول) بهتر از دو گروه دیگر عمل نموده است. البته شایان ذکر است در این مطالعه در سه گروه بررسی شده، دریافت کلسیم از طریق مصرف روزانه لبپیات کمتر از میزان توصیه شده RDA (کمتر از ۱۵۰۰ mg روزانه مصرف کلسیم از منابع عمدۀ مانند شیر، ماست، دوغ، پنیر، کره و کشک) بود. با توجه به مطالعه Schachter و همکاران مبنی بر افزایش هموسیستئین در بیماران PCOS (۱۸) و همچنین نقش هموسیستئین در معانعت از ورود کلسیم به داخل سلول آندوتیال (۱۷) و نتایج مطالعه Zborowski JV این بیماران در معرض استئوپروز قرار دارند (۸).

نتیجه‌گیری

با توجه به دریافت ناکافی کلسیم در رژیم غذایی روزانه و نقش کلسیم-Vit D در سلامت استخوان و بهداشت باروری، تکامل تخمک و همچنین یافته‌های مطالعات قبلی در ارتباط با کاهش عملکرد کلسیم درون سلولی در این بیماران و همچنین با توجه به عملکرد متغورمین در کاهش و تنظیم انسولین علاوه بر آن نقش شناخته شده کلسیم-Vit D در اصلاح و تنظیم انسولین؛ به نظر می‌رسد که مصرف همزمان این دو مکمل در اصلاح هیپرانسولینی ناشی از PCOS و متعاقب آن اصلاح اختلال قاعده‌گی و تکامل فولیکول موثرتر عمل نماید. انجام مطالعات وسیعتر اپیدمیولوژیک، آزمایشگاهی و بالینی در ارتباط با نقش کلسیم-Vit D در تکامل

این مطالعه تأکید می‌کند که غلظت کلسیم خارج سلولی نمی‌تواند نشان‌دهنده طبیعی بودن کلسیم داخل سلولی باشد.

در بررسی نقش کلسیم در درمان اختلالات قاعده‌گی روی سه گروه مورد مطالعه، اختلاف آماری معنی‌داری بین گروه‌ها دیده نشد. هرچند که در گروه کلسیم-متغورمین تنظیم قاعده‌گی به وضوح بیش از دو گروه دیگر بود. به نظر می‌رسد به دلیل کم بودن حجم نمونه این اختلاف معنی‌دار نشده است اما با افزایش حجم نمونه در گروه کلسیم-Vit D و متغورمین، در تنظیم Yacob اختلالات قاعده‌گی اثر بخش‌تر عمل نماید. مطالعه Vit D به میزان ۱۵۰۰ mg در مدت ۶ ماه در درمان اختلالات قاعده‌گی در ۱۳ خانم مبتلا به PCOS نشان داد که پس از دو ماه درمان، در ۷ نفر از نمونه‌ها اختلالات قاعده‌گی از بین رفت (۱۴).

با توجه به عملکرد متغورمین در کاهش و تنظیم انسولین و همچنین نقش کلسیم-Vit D در اصلاح اختلال انسولین، به نظر می‌رسد مصرف همزمان این دو مکمل در اصلاح اختلال انسولین بیماران و متعاقب آن کاهش آندروژن و تنظیم قاعده‌گی بهتر عمل نماید.

در ارتباط با پاسخ درمانی بر اندازه فولیکول متعاقب مداخله درمانی در بیماران PCOS، در آنالیز رگرسیون GEE بین گروهی، بین گروه کلسیم-Vit D و متغورمین (گروه ۲) و گروه کلسیم-Vit D (گروه ۱) از نظر آماری اختلاف دو گروه معنی‌دار بود. یعنی فراوانی نسبی پاسخ‌دهی رشد فولیکول در گروه کلسیم-Vit D متفورمین به نسبت دو گروه دیگر به طور معنی‌داری در ماههای پنجم و ششم بیشتر دیده می‌شود. در مطالعات انجام شده بر روی حیوانات نیز بلوغ تخمک متعاقب درمان با کلسیم تأیید شده است (۱۲). همچنین در مطالعه Velazquez در بیماران PCOS متعاقب ۶ ماه درمان با متغورمین کاهش انسولین و

پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی تهران به شماره قرارداد ۹۰۷/ ۱۳۲/ ۸۲/ ۲۸ مورخ ۸۲/ ۱۲/ ۲۸ می باشد.

از کلیه همکاران محترم مرکز تحقیقات بهداشت باروری ولیعصر و معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی تهران کمال تشکر را داریم.

فولیکول تحمدان انسانی، الزامی به نظر می‌رسد بتوان نقش ویتامین D و کلسیم را در بلوغ تحملک به ویژه در این سندرم به وضوح مشخص نمود تا در صورت تأیید دقیق‌تر این ارتباط، گامی موثر در درمان این بیماران با با هزینه کمتر و اثربخشی بیشتری برداشته شود.

تشکر و قدردانی

این مقاله نتیجه طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه علوم

References

- 1- Speroff L, Marc AF. Clinical gynecology endocrinology and infertility. 7th Edition. Lippincott Williams & Wilkins. 2005;Chapter 12,pp:465.
۲- نیرومنش شیرین، رضایی زهرا، افتخار زهرا و همکاران، اصول بیماریهای زنان و زایمان، هکر- مور، ویرایش سوم، موسسه فرهنگی، انتشاراتی سیمیا، ۱۳۷۸، صفحات: ۴۹۱-۴۸۹.
- 3- Jonathan S, Berek. Novak's Gynecology. Lippincott Williams & Wilkins. 13th Edition. 2002;Chapter27,pp: 996.
- 4- The Rotterdam ESHRE/ Asrm-sponsored PCOs consensus workshop group- revised 2003 consensus on diagnostic criteria and long term health risks related to polycystic ovary syndrome (PCOs). Human reproduction. 2004;19(1)pp:41-47.
- 5- Conway GS, Agarwal R, Betteridge DJ, Jacobs HS. Risk factors for coronary syndrome, clinical endocrinol. 1992;37(2):119-125.
- 6- Wild RA. Long-term health consequences of PCOs. Hum reprod update.2002;8(3):231-241.
- 7- Tallbot EO, Guzick DS, Sutton-tyrell K, McHugh-Pemu KP, Zborowski JV, Remsberg KE, Kuller LH. Evidence for association between polycystic ovary syndrome and premature carotid atherosclerosis in middle-aged women. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2000;20(11):2414-21.
- 8- Zborowski JV, Talbtt EO, Cauley JA. Polycystic ovary syndrome, androgen excess, and the impact on bone. Obstet Gynecol Clin North Am. 2001; 28(1):135-51.
- ۹- دکتر ملتی. کلسیم و دیابت، مجموعه مقالات پیرامون اختلالات ویتامین D، معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات غدد درون ریز متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران.
- 10- Jorde R, Sundsfjord J, Haug E, Bonaa KH. Relation between low calcium intake, parathyroid hormone, and blood pressure. Hypertension 2000;35: 1154-9.
- 11- Bostick RM, Kushi LH, Wu Y, Meyer KA, Sellers TA, Folsom AR. Relation of calcium, vitamin D, and dairy food intake to ischemic heart disease mortality among postmenopausal women. Am J Epidemiol 1999; 149:151-61.
- 12- Homa ST, Carroll J, Swann K. The role of calcium in mammalian oocyte maturation and egg activation. Hum Reprod 1993;8:1274-81.
- 13- Kaufman M, Homa ST. Defining a role for calcium in the resumption and progression of meiosis in the pig oocyte. J Exp Zool. 1993;265:69-76.
- 14- Thys- Jacobs S, Donovan D, Papadopoulos A, Sarrel P, Bilezikian J.P. Vitamin D and Calcium dysregulation in the polycystic ovarian syndrome. Steroids 1999; 64: 430-5.
- 15- Toth S, Huneau D, Banreza B, Ozil JP. Egg activation is the result of calcium signal summation in the Mouse. Reproduction. 2006;131(1):27-34.
- 16- Lee JH, Joon SY, Bae IH. Studies on Ca^{2+} - channel distribution in maturation arrested mouse oocyte. Mol Reprod Dev. 2004;69(2):174-85.
- 17- Zhang HS, Xiao JH, Cao EH, Qin JF. Homocysteine inhibits store- mediated calcium entry in human endothelial cells: evidence for involvement of membrane potential and actin cytoskeleton. Mol Cell Biochem. 2005;269(1-2):37-47.
- 18- Schachter M, Raziel A, Friedler S, Strassburger D, Bern O, Ron-El R. Insulin resistance in patients with polycystic ovary syndrome is associated with elevated plasma homocysteine. Hum Reprod. 2003;18(4):721-7.

- 19- Chen JC, Wangy L, Liu CP ,Liu Cp , Cheng JS, Chang HT,Yuk-Keung L, et all. Clomiphene, an ovulation inducing agent, causes $[Ca^{+2}]$ increases in human osteoblast like cells. Chin J Physiol. 2001;44(2):67-72.
- 20- Velazquez E, Acosta A, Mendoza SG. Menstrual cyclicity after Metformin therapy in polycystic ovary syndrome. Obstet Gynecol. 1997;90(3):395-5.
- 21- Kiatal H, Santuli R, Wright KH, Wallach EE. Examination of the role of calcium in the in vitro perfused ovary with use of ethyleneglycol-bis (beta-aminoethylether)ⁿ, n'- tetraacetic acid and verapamil. Am J Obstet Gynecol. 1985;152(6 pt 1):705-8.
- 22- Kobayashi K, Kiatai H, Santulli R, Wright KH and Wallach EE. Influence of calcium and magnesium deprivation on ovulation and ovum maturation in the perfused rabbit ovary. Biol Reprod 1984;31(2):287-95.
- 23- Racowasky C. The releasing action of calcium upon cyclic AMP dependent meiotic arrest in hamster oocytes. J EXP Zool. 1986;239:263-75.