

گزارش موردی از بروز سقط فراموش شده در حاملگی سرویکال

طیبه نادری (M.D.)

استادیار، بخش زنان و زایمان، بیمارستان شهید دکتر باهنر، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کرمان، کرمان، ایران.

چکیده

بلاستوسیست به طور طبیعی در لایه پوشاننده حفره رحم جایگزین می‌شود. جایگزینی در هر محل دیگری، بارداری خارج رحمی محسوب می‌شود که در بیش از ۹۵ درصد موارد در لوله‌های رحمی رخ می‌دهد. حاملگی سرویکال شکلی نادر از حاملگی خارج رحمی است که با کاشته‌شدن بلاستوسیست در داخل کانال سرویکس اتفاق می‌افتد. به دلیل عواقب و خطرات جدی که حاملگی سرویکال برای مادر ایجاد خواهد کرد باید همیشه آن را به عنوان یک تشخیص افتراقی مهم در خونریزی‌های نیمه اول حاملگی در نظر داشت. در این مقاله وقوع سقط فراموش شده در حاملگی سرویکال در یک زن ۳۲ ساله $G_7P_7Ab_0Dch_0 Lch_7$ گزارش می‌شود. این بیمار به علت خونریزی واژینال که از ۲۵ هفته قبل بطور متناوب ادامه داشته مراجعه کرده بود. در طی این مدت دو نوبت سونوگرافی در هفته ۱۲ و ۲۲ حاملگی در مرکز دیگری انجام داده بود که یکبار G.S مطابق با ۱۲ هفته حاملگی بدون اکوی جنینی و یکبار توده‌ای به ابعاد $27 \times 16 mm$ در ناحیه فوندوس، حفره اندومتر پر از مایع و در آندکس چپ کیستی به ابعاد $53 \times 44 mm$ گزارش شده بود. بیمار در هفته ۲۵ حاملگی با تشخیص سقط فراموش شده تحت کورتاژ قرار گرفت که در جریان کورتاژ به علت خونریزی واژینال و افت سریع علائم حیاتی تحت لاپاراتومی قرار گرفت. در لاپاراتومی به دلیل وجود سرویکس کاملاً متسع که بطور کامل توسط تروفوبلاستها مورد تهاجم قرار گرفته و تخریب شده بود با تشخیص حاملگی سرویکال تحت هیستریکتومی با حفظ تخمدانها قرار گرفت. گزارش پاتولوژی نشان دهنده کاشته شدن و نفوذ کامل جفت در ناحیه اندوسرویکس بود.

کل واژگان: حاملگی خارج از رحم، حاملگی سرویکال، سقط فراموش شده و هیستریکتومی.

آدرس مکاتبه: دکتر طیبه نادری، گروه زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کرمان، کرمان، ایران.
پست الکترونیکی: tayebeh_naderi@yahoo.com