

ارتباط بین کیفیت DNA اسپرم و میزان موفقیت IVF در زوج‌های نابارور

محمود دهقانی‌اشکذری (Ph.D.)^۱، سید مهدی کلانتر (Ph.D.)^۲، کاظم پریور (Ph.D.)^۳، عباس افلاطونیان (Ph.D.)^۴

۱- استادیار، گروه سلولی-مولکولی، مرکز تحقیقات مولکولی، دانشگاه آزاد اسلامی اشکذر، یزد، ایران.

۲- دانشیار، واحد تولید مثل و ژنتیک، مرکز تحقیقاتی-درمانی ناباروری، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران.

۳- استاد، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران، تهران، ایران.

۴- دانشیار، گروه زنان و زایمان و نازایی، مرکز تحقیقاتی درمانی ناباروری، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: امروزه استفاده از تکنیک‌های کمک باروری (ART) مشکل بسیاری از افرادی که از ناباروری رنج می‌برند را برطرف نموده است. تکرار سیکلهای درمانی، صرف وقت و هزینه نسبتاً زیاد درمان، مشکلات احتمالی ناشی از بیهوشی‌های مکرر، محققین را به سمت یافتن راه‌هایی برای پیش‌بینی میزان موفقیت استفاده از هر یک از تکنیک‌های مورد استفاده برای هر فرد نموده است. بیش از نیمی از موارد ناباروری با علت مردانه می‌باشد. هرچند آنالیز مایع منی به عنوان یکی از آزمایشات اولیه جهت تشخیص علی قدرت باروری اسپرم ضروری می‌باشد؛ ولی با این وجود آنالیز اسپرم در درصد قابل توجهی از بیماران قدرت پیش‌بینی نتایج لقادیر را نداشت و استفاده از تست‌های عملکردی اسپرم در کنار آنالیز مایع منی پیشنهاد می‌شود. یکی از این تست‌های عملکردی، بررسی وضعیت DNA دو رشته‌ای اسپرم می‌باشد. در این تحقیق ارزش تشخیصی میزان DNA دو رشته‌ای اسپرم در پیش‌بینی موفقیت لقادیر خارج رحمی (IVF) مورد ارزیابی قرار گرفته است.

روش بررسی: طی این مطالعه ۱۰۰ مرد نابارور که همسران آنها ناباروری با علت مشخص زنانه نداشتند مورد مطالعه قرار گرفتند. آنالیز استاندارد مایع منی شامل تعداد، حرکت و مورفو‌لوژی اسپرم بر روی نمونه منی انجام شد. آزمایش عملکردی سنجش طبیعی بودن DNA اسپرم به کمک رنگ‌آمیزی Acridin Orange صورت گرفت و با توجه به طیف رنگی در زیر میکروسکوپ اپی‌فلورسانس با طول موج ۴۹۰-۴۵۰ nm مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. براساس نتایج لقادیر، افراد به سه گروه لقادیر کمتر از ۵۰٪ و گروه بیش از ۵۰٪ و نیز شکست کامل لقادیر (TFF) دسته‌بندی شد. جهت تجزیه و تحلیل نتایج از آنالیز واریانس یک طوفه و محاسبه ضریب همبستگی و سطح زیر منحنی ROC استفاده شد و مقدار $p < 0.05$ معنی‌دار در نظر گرفته شد. به منظور سطح قابل پیش‌بینی، از منحنی ROC استفاده گردید.

نتایج: آنالیز اطلاعات نشان داد که ارتباط معنی‌داری بین درصد لقادیر در IVF و تعداد اسپرم، میزان حرکت آنها وجود نداشت ولی ارتباط آن با تعداد اسپرم دارای حرکت درجه معنی‌دار بود. در این مطالعه مورفو‌لوژی پس از رنگ‌آمیزی نمونه‌ها با روش پاپانیکولا فقط ارتباط معنی‌داری بین ناقص ناحیه دم و درصد لقادیر وجود داشت. آنالیز واریانس میانگین‌های DNA دو رشته‌ای افراد با درصد لقادیر مساوی یا کمتر از پنجماه درصد و بیشتر از پنجماه درصد و موارد شکست در لقادیر نشان می‌دهد که اختلاف در $p < 0.05$ معنی‌دار است. آنالیز ROC نشان داد که در لقادیر 50% نقطه برش برای طبیعی بودن DNA $25/47\%$ می‌باشد.

نتیجه‌گیری: آزمایش‌های آنالیز مایع منی اگرچه برای تشخیص ناباروری ضروری هستند؛ ولی برای پیش‌بینی نتایج IVF کافی نیستند. استفاده از آزمایش‌های عملکردی ارزیابی DNA اسپرم برای پیش‌بینی میزان موفقیت و یا شکست لقادیر در سیکلهای ART مفید می‌باشد. براساس این نتایج در مواردی که میزان اسپرم‌های دارای DNA طبیعی کمتر از $25/47\%$ باشد میزان موفقیت نتایج لقادیر نیز پایین خواهد بود و قبل از شروع سیکل درمانی و تحمیل هزینه به زوج، باید با روش‌های مناسب کیفیت DNA اسپرم را بهبود بخشدید.

کلید واژگان: کروماتین اسپرم، ناباروری مردان، لقادیر خارجی رحمی، طبیعی بودن DNA، DNA دو رشته‌ای، اکریدین نارنجی.

مسئل مکاتبه: دکتر سید مهدی کلانتر، واحد ژنتیک و تولید مثل، مرکز تحقیقاتی درمانی ناباروری یزد، یزد، ایران.

پست الکترونیک: smkalantar@yahoo.com