

گزارش یک مورد نادر بارداری ترم در نارسایی سرویکس به دنبال استراحت مطلق

صدیقه آیتی (M.D)^۱، فاطمه وحید رودسری (M.D)^۱، لیلا پورعلی (M.D)^۱

- گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: نارسایی سرویکس یکی از عوامل خطرساز در ایجاد زایمان زودرس می‌باشد که با دیلاتاسیون بدون درد آن و پرولاپس پرده‌های جنینی به داخل واژن در سه ماهه دوم و سوم بارداری مشخص می‌شود. هدف از ارائه این گزارش، معرفی یک مورد نادر نارسایی سرویکس در سه ماهه دوم بارداری است که با درمان انتظاری با موفقیت بارداری به سرانجام رسید.

معرفی مورد: بیمار خانمی ۲۴ ساله و با تاریخچه نارسایی سرویکس در بارداری قبلی بود که در بارداری دوم با دیلاتاسیون و افاسمان در هفته ۲۴ بارداری بسته و با استراحت در بستر و درمان‌های نگهدارنده با موفقیت بارداری را در هفته ۳۹ به پایان رساند.

نتیجه‌گیری: درمان انتظاری به صورت استراحت در بستر در وضعیت مناسب همراه با تجویز پروفیلاکسی داروهای ضد انعقادی می‌تواند برای اداره نارسایی سرویکس در مراحل پیشرفته بارداری که خطر بارز زایمان زودرس وجود دارد، روش موثر و بی‌خطری باشد.

کلید واژگان: نارسایی سرویکس، سرکلاژ، استراحت مطلق، زایمان زودرس، بارداری ترم، دیلاتاسیون، افاسمان.

مسئول مکاتبه: دکتر فاطمه وحید رودسری، مرکز تحقیقات سلامت زنان، بیمارستان قائم (عج)، مشهد، ایران.

پست الکترونیک: ff_vahid@yahoo.com