

گزارش یک مورد نادر هیسترکتومی بهدلیل جفت اینکرتتا در سه ماهه اول بارداری

صدیقه آیتی (M.D)^{۱،۲}، سارا میرزائیان (M.D)^{۱،۲}، فاطمه وحیدروفسری (M.D)^{۱،۲}، نیره قمیان (M.D)^{۱،۲}، نزهت موسوی فر (M.D)^{۱،۲}

۱- گروه زنان و مامایی، بیمارستان قائم (عج)، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی مشهد، مشهد، ایران

۲- گروه زنان و مامایی، بیمارستان امام رضا (ع)، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی مشهد، مشهد، ایران

۳- مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

زمینه و هدف: جفت اینکرتتا عارضه‌ای ناشایع و تهدیدکننده حیات مادر در دوران بارداری است. این عارضه معمولاً به صورت خونریزی واژینال به دنبال خارج کردن مشکل جفت در سه ماهه سوم ظاهر می‌یابد. با وجود این، جفت اینکرتتا ممکن است باعث ایجاد عوارضی مانند سقط‌های سه ماهه اول و دوم گردد که تشخیص آن مشکل می‌باشد. هدف از ارائه این گزارش، معرفی یک مورد نادر هیسترکتومی بهدلیل جفت اینکرتتا در سه ماهه اول بارداری می‌باشد. معرفی مورد: بیمار خانمی ۳۴ ساله بود که ۱۸ روز پس از کورتاژ بهدلیل سقط ناقص، با خونریزی شدید واژینال در بارداری چهارم به بیمارستان مراجعه کرد. نامبرده سابقه ۲ مورد سزارین قبلی داشت. به علت خونریزی شدید با تشخیص احتمالی تخلیه ناکامل رحم، مجددأ تحت عمل کورتاژ قرار گرفت که به علت خونریزی غیرقابل کنترل هین عمل برای وی هیسترکتومی انجام شد. در بررسی آسیب‌شناسی، جفت اینکرتتا در سگمنت تحتانی رحم گزارش گردید. **نتیجه‌گیری:** در زنان با سابقه سزارین قبلی، احتمال جایگزینی غیرطبیعی جفت وجود دارد که حتی در سه ماهه اول بارداری نیز ممکن است دچار خونریزی غیر قابل کنترل گردد که بدلیل ماهیت غیر طبیعی جفت، ممکن است حتی نیاز به هیسترکتومی اورژانس ایجاد شود.

کلید واژگان: جفت اینکرتتا، جفت سرراهی، خونریزی رحمی، سزارین، سقط ناقص، سه ماهه اول بارداری، کورتاژ، هیسترکتومی.

مسئول مکاتبه: دکتر فاطمه وحیدروفسری، مرکز تحقیقات سلامت زنان، بیمارستان قائم (عج)، مشهد، ایران.

پست الکترونیک: ff_vahid@yahoo.com

دربیافت: ۸۷/۲/۱۰ پذیرش: ۸۷/۶/۱۳