

اثرات داروی اسپیرونولاکتون روی هورمون‌های محور هیپوفیز-گناد در موش‌های صحرایی ماده

فرهاد مرادی (M.Sc)^۱، اکبر زراعت‌پیشه (Ph.D)^۲، مهرداد شریعتی (Ph.D)^۳، مختار مختاری (Ph.D)^۴

۱- گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد نورآباد ممسنی، ممسنی، ایران

۲- گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد جیرفت، جیرفت، ایران

۳- گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کازرون، کازرون، ایران

چکیده

زمینه و هدف: اسپیرونولاکتون به عنوان یک داروی دیورتیک و آنتاگونیست آلدوسترون در درمان فشار خون بالا، اختلالات کبدی، کلیوی و قلبی و همچنین پرمومی در زنان مصرف می‌گردد. از اثرات جانبی این دارو، کاهش میل جنسی و اختلال در قاعدگی گزارش شده است. با توجه به عدم بررسی اثرات اسپیرونولاکتون روی هورمون‌های محور هیپوفیز-گنادها، این تحقیق با هدف بررسی اثرات احتمالی این دارو بر هورمون‌های این محور انجام گرفت.

روش بررسی: پژوهش حاضر روی پنج گروه موش صحرایی بالغ، هر گروه شامل نه سر موش انجام شد. گروه کنترل هیچ دارویی دریافت نکردند. گروه شم حلال داروی اسپیرونولاکتون (سرم فیزیولوژی) و گروه‌های تیمار ۱ تا ۳ به ترتیب غلظت‌های ۵۰ و ۱۰۰ mg/kgBW اسپیرونولاکتون را به صورت دهانی-حلقی (خوارکی) و به مدت ۱۴ روز دریافت کردند. پس از طی این مدت هورمون‌های LH، FSH، استروژن و پروژسترون به روش رادیوایمونوآسی (RIA) مورد سنجش قرار گرفت و نتایج حاصل بین گروه کنترل و سایر گروه‌ها مورد مقایسه قرار گرفت. $^{*}p < 0.05$ به عنوان سطح معنی‌داری در نظر گرفته شد.

نتایج: میانگین غلظت هورمون FSH در گروه‌های تیمار ۱ تا ۳ و گروه‌های شم و کنترل (به صورت $M \pm SEM$) به ترتیب $0.0/0.0$ ، $0.0/0.0$ ، $0.0/0.0$ و $0.0/0.0$ بود که فقط در گروه تیمار ۳ افزایش معنی‌داری را نسبت به گروه کنترل نشان داد. مقدار هورمون LH نیز به ترتیب $0.0/0.0$ ، $0.0/0.0$ ، $0.0/0.0$ و $0.0/0.0$ بود. کیله مقادیر LH، FSH بر حسب mIU/mL بروز $50.0 mg/kg B.W.$ نسبت به گروه کنترل تغییرات معنی‌داری دیده شد. کیله مقادیر LH، FSH بر حسب می‌باشد. مقادیر هورمون است روزن بر حسب pg/mL به ترتیب $0.0/0.0$ ، $0.0/0.0$ ، $0.0/0.0$ و $0.0/0.0$ و همچنین مقادیر هورمون پروژسترون بر حسب pMol/mL به ترتیب $0.0/0.0$ ، $0.0/0.0$ ، $0.0/0.0$ و $0.0/0.0$ بود که در هیچ یک از گروه‌های تجربی و شم نسبت به گروه کنترل اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد. نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه حاضر نشانگر تاثیر معنی‌دار و وابسته به دوز داروی اسپیرونولاکتون بر هورمون‌های LH و FSH می‌باشد. همچنین بیانگر این است که این دارو تاثیری بر غلظت هورمون‌های جنسی ندارد و بنابراین مصرف آن باعث اختلالات هورمونی نمی‌گردد.

کلید واژگان: اسپیرونولاکتون، استروژن، پروژسترون، محور هیپوفیز-گناد، موش‌های صحرایی، هورمون‌های جنسی، LH، FSH.

مسئول مکاتبه: دکتر اکبر زراعت‌پیشه، بن بست سوم، کوچه مدنی ۳، خیابان مدنی، نورآباد ممسنی، کدپستی: ۳۷۶۶۷-۷۳۵۱۹، فارس، ایران.

پست الکترونیک: a.zeraatpishe@yahoo.com

دریافت: ۸۷/۶/۲۷ پذیرش: ۸۷/۱۰/۴