

## ارزیابی و مقایسه محیطها و روش‌های مختلف انجاماد و نگهداری اسپرم (بانک اسپرم)

اصغر طالبیان (M.Sc)<sup>۱</sup>، محمدرضا صادقی (Ph.D)<sup>۲</sup>، هونم صدری اردکانی (M.D)<sup>۳</sup>، مصصومه بلورزاده (A.D)<sup>۴</sup>، محمدمهردی آخوندی (Ph.D)<sup>۵</sup>.

- ۱- مربی، گروه غدد تولید مثل و جنین‌شناسی، پژوهشکده فناوریهای نوین علوم پزشکی جهاددانشگاهی- ابن‌سینا، تهران، ایران.
- ۲- استادیار، گروه غدد تولید مثل و جنین‌شناسی، پژوهشکده فناوریهای نوین علوم پزشکی جهاددانشگاهی- ابن‌سینا، تهران، ایران.
- ۳- مربی، گروه غدد تولید مثل و جنین‌شناسی، پژوهشکده فناوریهای نوین علوم پزشکی جهاددانشگاهی- ابن‌سینا، تهران، ایران.
- ۴- تکنسین آزمایشگاه، مرکز درمان ناباروری ابن‌سینا، پژوهشکده فناوریهای نوین علوم پزشکی جهاددانشگاهی- ابن‌سینا، تهران، ایران.

### چکیده

زمینه و هدف: انجاماد شاخه‌ای از علم کرایوبیولوژی است که به حفظ و نگهداری طولانی مدت سلول در دمای بسیار پایین می‌پردازد. انجاماد اسپرم به طور معمول در مراکز درمان ناباروری و بانک‌های نگهداری اسپرم و صنعت دامپروری انجام می‌شود. روند انجاماد همواره سبب کاهش عملکرد و ظرفیت باروری اسپرمها می‌گردد؛ چند سالی است که تأثیر روشها و محیط‌های مختلف انجاماد در تحرک اسپرم مورد ارزیابی قرار گرفته است. با این وجود هرگز بهترین محیط انجاماد اسپرم معرفی نشده است و بنابراین روش استاندارد انجاماد اسپرم نیز وجود ندارد؛ لذا معرفی تکنیک مناسب انجاماد و نیز محیط مناسب انجاماد بر اساس یافته‌های تجربی بسیار ضروری به نظر می‌رسد. بنابراین هدف اصلی این مطالعه بررسی میزان بقا و تحرک اسپرم طی روند انجاماد به کمک سه محیط مختلف انجاماد شامل HSPM، TYBG و GEYC با روشهای انجاماد آهسته به کمک دستگاه (برنامه‌ریزی شده) و روشهای غیردستگاهی (انجاماد در فاز بخار ازت مایع) می‌باشد.

روش بررسی: تعداد ۲۲ نمونه مایع سمتیمال از افراد طبیعی، در ظروف یکبار مصرف استریل جمع‌آوری شد. آنالیز مایع سمتیمال مطابق استاندارد WHO انجام گردید. برنامه انجاماد آهسته به دستگاه (روش برنامه‌ریزی شده) و انجاماد در فاز بخار ازت مایع (روش غیردستگاهی) مطابق پروتکل موجود انجام شد. غلظت اسپرم قبل از انجاماد و درصد تحرک بر روی نمونه‌های تازه و نیز ذوب شده پس از یک هفته ارزیابی گردید. درصد بازیافت اسپرم متحرک تحت عنوان فاکتور بقاء (CSF) تعریف شد. هر نمونه سیمین به ۳ قسمت تقسیم و هر قسمت با یکی از محیط‌ها مخلوط گردید. مخلوط نمونه با هر یک از محیط‌ها به دو بخش تقسیم شدند. بخشی از نمونه با هر یک از سه محیط مختلف به روشن فاز بخار ازت مایع و بخش دیگر توسط دستگاه به روشن آهسته منجمد گردیدند. آنالیز آماری با استفاده از برنامه SPSS ویرایش ۱۱ آزمون t- test مقایسه تحرک اسپرمها قبل از انجاماد و بعد از ذوب کردن با روشهای مختلف انجاماد و آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون تقریبی LSD جهت مقایسه تحرک قبل و بعد از انجاماد با سه محیط مختلف انجام شد و سطح معنی‌داری ۰/۰۵ در نظر گرفته شد.

نتایج: براساس نتایج، میانگین درصد تحرک اسپرم قبل از فریز کردن ۴۶/۱۳±۸/۲۹ بوده، اما پس از ذوب طی روشن انجاماد آهسته با دستگاه، با محیط‌های HSPM (۱۶/۹±۵٪)، محیط GEYC (۱۶/۳۱±۴/۵٪) و محیط TYBG (۱۶/۰۴±۴/۷٪) و همچنین طی روشن انجاماد در فاز بخار ازت با محیط‌های HSPM (۱۶/۹۵±۴/۵٪)، محیط GEYC (۱۶/۱۳±۵/۱٪) و محیط TYBG (۱۶/۱۸±۴/۴٪) کاهش چشمگیری نشان داد. تفاوت معنی‌داری بین روشن دستگاهی و روشن فاز بخار ازت با هر یک از دو محیط GEYC (p=۰/۰۱) و TYBG (p=۰/۰۷) مشاهده گردید. همچنین تفاوت معنی‌داری بین محیط HSPM و دو محیط GEYC (p=۰/۰۵) و TYBG (p=۰/۰۵) وجود داشت.

نتیجه‌گیری: براساس یافته‌های این مطالعه پس از ذوب طی روشن انجاماد آهسته با دستگاه و روشن استفاده از فاز بخار ازت مایع با هریک از سه محیط HSPM، GEYC و TYBG کاهش چشمگیری در تحرک اسپرم نسبت به قبل از انجاماد ملاحظه می‌گردد. ولی بهترین بازده تحرک و میزان بقا اسپرم پس از ذوب طی روشن انجاماد آهسته توسط دستگاه بدست آمد و در مقایسه محیط‌های انجاماد، در محیط HSPM به صورت معنی‌داری میزان بقاء اسپرمها پس از ذوب نسبت به محیط‌های TYBG و GEYC (P-value=۰/۰۵) بالاتر بود؛ ولی با توجه به عدم امکان دسترسی به دستگاه انجاماد در تمامی مراکز، استفاده از محیط انجاماد HSPM و روشن انجاماد در فاز بخار برای نمونه‌های سیمین نرمال توصیه می‌گردد.

**کلید واژگان:** بانک اسپرم، انجاماد، محیط انجاماد، HSPM، GEYC، TYBG، روشن انجاماد در فاز بخار، و روشن انجاماد آهسته.

**مسئلۀ مکاتبه:** دکتر محمدمهردی آخوندی، گروه غدد تولید مثل و جنین‌شناسی، پژوهشکده فناوریهای نوین علوم پزشکی جهاددانشگاهی- ابن‌سینا، صندوق پستی ۱۷۷-۱۹۸۳۵، اوین، تهران، ایران.

پست الکترونیک: akhondi@avesina.ac.ir

محیط‌های نگهدارنده بسیار محدود است (۵) و پیشرفت روند انجماد با کشف اتفاقی گلیسرول به عنوان نگهدارنده مناسب برای اسپرم‌های گاو توسط Polge همکاران در سال ۱۹۴۹ آغاز گردید (۷). اولین نوزاد حاصل از اسپرم منجمد شده انسان در سال ۱۹۵۳ متولد شد (۸). محیط GEYC<sup>۶</sup> که امروزه جهت انجماد اسپرم انسان استفاده می‌شود؛ در ابتداء توسط Ackerman در اوایل دهه ۱۹۶۰ معرفی گردید (۱). طی ۳۰ سال گذشته پیشرفت‌های چشمگیری در زمینه تشکیل بانک اسپرم، استفاده از روش‌های مختلف انجماد و محیط‌های مختلف رخداده است. انجماد اسپرم برنامه‌ای روتین جهت سهولت دسترسی به مایع سمنیال اهداءکنندگان، جهت تلقیح در موارد واژکتومی یا شیمی درمانی و نیز در سال‌های اخیر در بیماری ایدز، می‌باشد. از این رو بهینه نمودن میزان بقاء اسپرم در برنامه‌های انجماد بسیار ضروری به نظر می‌رسد. یکی از عوامل اساسی مؤثر در میزان بقاء اسپرم طی انجماد، محیط و روش مورد استفاده جهت حفظ و نگهداری اسپرم می‌باشد (۹). امروزه استفاده از اسپرم اهداء کننده (AID)<sup>۷</sup> جهت تلقیح مصنوعی و تلقیح توسط اسپرم شوهر (AIH)<sup>۸</sup> به طور روتین انجام می‌گردد (۱۰) و انجماد اسپرم- تخمک و جنین انسان طی مراحل مختلف اولیه تا بلاستوسیست یکی از اهداف اصلی برنامه IVF می‌باشد. سه محیط متدائل که بیشتر در انجماد اسپرم مورد استفاده قرار می‌گیرند، شامل محیط HSPM<sup>۹</sup>، GEYC<sup>۱۰</sup> و محیط TYBG<sup>۱۱</sup> می‌باشند (۳). با توجه به اینکه روند انجماد، سبب کاهش ظرفیت باروری اسپرمها از طریق آسیب به غشاء سلولی و نیز آسیب به تحرک اسپرمها و تغییر در مورفولوژی و آسیب آکروزومی، آسیب به DNA و

## زمینه و هدف

انجماد<sup>۱</sup> شاخه‌ای از علم کرایوبیولوژی<sup>۲</sup> است که به حفظ و نگهداری طولانی مدت سلول در دمای بسیار پایین می‌پردازد (۱). مکانیسم انجماد بر این پایه استوار است که هرگاه آب موجود در سلول در اثر کاهش مناسب حرارت به یخ تبدیل گردد، به گونه‌ای که بدون آسیب به سلول، به طور مؤثر حرکات مولکولی را متوقف کند، فرآیندهای بیوشیمیایی سلول به تعویق افتاده و یا متوقف می‌شود و در نتیجه بقا سلول افزایش می‌یابد (۱). مهمترین اصل در فرآیند انجماد، کاهش آسیب در اثر تشکیل بلورهای یخ<sup>۳</sup> داخل سلولی و نمک‌های سمی موجود در سلول است که با سرد کردن آهسته و خروج آب داخل سلولی تا حد مناسب، قبل از سرد کردن یا طی آن، به همراه یک جایگزین مناسب انجام می‌شود (۲). تاریخچه انجماد اسپرم به حدود ۲۰۰ سال قبل بر می‌گردد. در سال ۱۷۷۶ Spellazani گزارش کرد که مایع سمنیال یخ‌زده حیوان در برف، پس از دوباره رساندن به حرارت محیط (ذوب)<sup>۴</sup> تحرک اسپرم خود را بدست آورده است. در سال ۱۸۶۶ Metegazza متوجه شد که تعداد کمی از اسپرم‌های مایع منی که به مدت طولانی در حرارت ۱۵°C- ذخیره شده بود پس از ذوب دوباره تحرک خود را بدست آورده‌اند (۳-۵). بعدها بانک اسپرم برای نگهداری اسپرم‌های حیوانات انسان پیشنهاد گردید (۳). در سال ۱۹۳۷ Jahnel به طور اتفاقی مشاهده کرد که بخشی از اسپرم‌های انسان با ذخیره‌سازی در حرارت‌های ۷۹°C- ۱۹۶°C و ۲۶۹°C- زنده می‌مانند (۶). آزمایشات اولیه با مایع سیمن یخ‌زده انسان، بازده تحرک پس از ذوب را در حدود ۱۰٪ گزارش نمودند (۳). به هر حال بازده تحرک و بقا اسپرمها در غیاب

6- Glycerol Egg Yolk Citrate

7-Artificial Insemination by Donor

8- Artificial Insemination by Husband

9- Human Sperm Preservation Medium

10- Test Yolk Buffer- Glycerol

1-Cryopreservation

2-Cryobiology

3- Ice formation

4- Dehydratation

5-Thawing

شرکت Planer انگلستان، بافر TES (T-1030)، دکستروز (D-9434)، پنی سیلین-G، استرپتومایسین (G-6152)، سیترات سدیم<sup>۸</sup> (S-4641)، گلوکز (S-0890)، Sigma گلایسین (G-8898) تهیه شده از شرکت Merck گلیسرول (104093)، تهیه شده از شرکت Fertipro Sperm (HSPM) Germany، محیط آماده Freeze<sup>TM</sup>، France (تهیه گردید).

۱- تهیه نمونه‌های مایع سمینال: تعداد ۲۲ نمونه مایع سمینال از افراد طبیعی بعد از ۵-۲ روز خودداری از نزدیکی، در ظروف یکبار مصرف استریل جمع آوری گردید. نمونه‌ها به مدت ۳۰ دقیقه در دمای ۳۷°C قرار داده شدند تا از حالت لخته خارج شوند. آنالیز مایع سمینال مطابق استاندارد WHO انجام گرفت (۱۲). غلظت اسپرم (تعداد اسپرم در هر میلی‌لیتر) قبل از انجماد و میزان تحرك (درصد اسپرم‌های متحرك به کل اسپرم‌ها) بر روی نمونه‌های تازه و نیز بعد از ذوب ارزیابی گردید. میزان بازیافت اسپرم متحرك تحت عنوان فاکتور بقاء (CSF)<sup>۹</sup> به صورت زیر تعریف شد:

$$\text{CSF} = \frac{\text{درصد تحرك اسپرم‌ها پس از ذوب کردن}}{\text{درصد تحرك اسپرم‌ها قبل از انجماد}} \times 100$$

هر نمونه سمین به ۳ قسمت تقسیم گردید و هر قسمت با یک محیط تهیه شده به روش زیر، مخلوط گردید. مخلوط نمونه با هر یک از محیط‌ها به دو بخش تقسیم گردیدند. بخشی از نمونه با هر یک از سه محیط مختلف به روش انجماد آهسته در فاز بخار ازت مایع و بخش دیگر به روش انجماد آهسته توسط دستگاه منجمد گردید.

## ۲- طرز تهیه محیط‌ها:

- محیط HSPM: این محیط که حاوی آلبومین سرم انسانی به غلظت ۴/۹ g/l و گلیسرول ۲۰٪ (۷/۷) می‌باشد به صورت تجاری و آماده مصرف، استفاده گردید که

درستی ساختمان و عملکرد اسپرم می‌گردد؛ چند سالی است که ارزیابی روش‌های مختلف انجماد جهت بررسی تأثیر آنها در تحرک اسپرم انجام گرفته است. از طرف دیگر، محیط‌های نگهدارنده مختلف اسپرم‌ها را از اثرات منفی در روند انجماد حفاظت می‌کنند. بسیاری از مراکز از بافرهای TES-Tris حاوی زرده تخمرغ (محیط HSPM) و نیز برخی از مراکز از محیط‌های دیگری همچون GEYC استفاده می‌کنند. اگرچه تمامی محیط‌های نگهدارنده، اسپرم را از نظر کیفیت تاحدودی حفظ می‌کنند؛ ولی هرگز بهترین محیط جهت انجماد اسپرم شناخته نشده و هیچ روش استاندارد انجماد اسپرم معرفی نشده است (۹، ۱۲) و لذا ارائه روش مناسب انجماد و نیز استفاده از محیط مناسب بر اساس یافته‌های تجربی ضروری به نظر می‌رسد. بنابراین هدف اصلی این مطالعه بررسی میزان بقا و تحرک اسپرم در سه محیط مختلف شامل HSPM، TYBG و GEYC با دو روش مختلف انجماد شامل روش انجماد آهسته با دستگاه (روش دستگاهی) و روش انجماد در فاز بخار ازت مایع (روش غیردستگاهی) می‌باشد که هر دو جزء فرآیند انجماد به روش سرد کردن آهسته است. این مطالعه اثرات محیط‌های فوق و روش انجماد روی تحرک اسپرم و بقاء اسپرم را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

## روش بررسی

مواد و وسایل مورد نیاز شامل نی<sup>۱</sup>، ضامن<sup>۲</sup>، ویزوتیوب<sup>۳</sup>، گابلت<sup>۴</sup>، کین<sup>۵</sup> و کین استر<sup>۶</sup> (CryoBio System, France)، تانک نگهداری<sup>۷</sup> و دستگاه فریز (Cryo440-1.7, Mode Kryo 10) هر دو ساخت

1- Straw

2- Rods

3- Visotube

4- Goblet

5- Cane

6- Canister

7- Dewar

8- Trisodium citrate

9- Cryo Survival Factor

اضافه و خوب مخلوط گردید. نمونه به مدت ۱۰ دقیقه در دمای آزمایشگاه قرار داده شد؛ سپس مخلوط محیط و نمونه را به داخل نی‌های ۰/۲۵ میلی‌لیتری کشیده شد، با باقی گذاشتن حدود ۱cm هوا در دو طرف نی‌ها، دهانه نی توسط ضامن بسته شد. کار به صورت دوتایی انجام گردید یعنی برای هر نمونه با هر یک از سه محیط نگهدارنده مختلف و هر یک از روش‌های غیردستگاهی یا دستگاهی، دو عدد نی منجمد گردید. در روش انجام در فاز بخار از یک فلاسک دو جداره جهت فریز کردن استفاده شد و جهت نگهداری نی‌ها بر روی بخار نیز از سینی شبکه‌ای مکعب مستطیل در ابعاد مناسب استفاده گردید. دو عدد نی از هر نمونه و از هریک از سه محیط مختلف به مدت ۳۰ دقیقه روی بخار ازت مایع به فاصله حدود ۲۵ cm از مایع ازت به حالت افقی قرار داده شدند (کاهش حرارت از حرارت اتاق به حرارت  $C - 80^{\circ}$  و با سرعت انجام  $C/min - 10^{\circ}$ ). سپس کل نی‌ها در داخل ازت مایع فرو برده شد و در تانک ازت مناسب ذخیره گردید ( $C - 196^{\circ}$ ). دو عدد نی دیگر از هر نمونه و با هر یک از سه محیط مختلف توسط دستگاه انجام به صورت زیر منجمد گردید:

- (۱) کاهش درجه حرارت از  $+25^{\circ}C$  تا  $-6^{\circ}C$  با سرعت سردکردن  $2^{\circ}C/min$
- (۲) نگهداشتن در درجه حرارت  $C - 6^{\circ}$  برای مدت ۱۰ دقیقه
- (۳) کاهش حرارت از  $C - 6^{\circ}$  تا حرارت  $C - 30^{\circ}$  با سرعت انجام  $3^{\circ}C/min$
- (۴) کاهش حرارت از  $C - 30^{\circ}$  تا حرارت  $C - 196^{\circ}$  با سرعت انجام  $40^{\circ}C/min$
- (۵) قرار دادن نی‌ها در نیتروژن مایع.

۴- نوب مجدر/اسپرم؛ نمونه‌ها پس از یک هفته بعد از مرحله انجام، نوب گردید. جهت ذوب، نی‌های مورد نیاز از نیتروژن مایع خارج و پس از تاخیر ۱۰ ثانیه‌ای در محیط آزمایشگاه، برای مدت ۵ دقیقه در بن ماری

به صورت ۱::۷ ml میخیط نگهدارنده ۱ml+ مایع سینیال) با نمونه سینم مخلوط گردید (۱۱-۱۹).

**- محیط TYBG:** این محیط که حاوی زرد تخم مرغ و گلیسرول می‌باشد، برای حجم ۱۰۰ ml به صورت زیر تهیه می‌شود: بافر TES با غلظت ۱۷۶ mM، بافر Tris با غلظت ۸۰ mM و دکستروز با غلظت ۹ mM. مقدار احتساب شده برای هر ۱۰۰ ml از مواد فوق در حدود ۵۰ ml آب مقطر حل شد و سپس به غلظت ۱۰۰ U/ml (v/v) گلیسرول، ۱۰۰ µg/ml استرپتومایسین سولفات اضافه گردید. پس از تنظیم pH=۷/۴ به حجم ۱۰۰ ml رسانده شد. محلول نهایی با استفاده از فیلتر ۰/۲۲µm صاف و به حجم‌های کوچک ۸ ml منجمد گردید. موقع استفاده به غلظت ۰/۲۰ (v/v) زرد تخم مرغ تازه اضافه شد (به ۸ ml از محیط ۲ ml زرد تخم مرغ) و نمونه‌های سینم به صورت ۱:۱ با این محیط مخلوط گردید (۱۱-۱۴).

**- محیط GEYC:** این محیط نیز که حاوی زرد تخم مرغ و گلیسرول می‌باشد، برای حجم کلی ۱۰۰ ml به صورت زیر تهیه شد: ۲ g سدیم تری‌سیترات، ۰/۸ gr گلوکز، ۰/۸ gr فروکتوز و ۰/۲ gr گلایسین در حدود ۵۰ ml آب مقطر حل گردید و ۲۱/۳ ml گلیسرول به آن اضافه و پس از تنظیم pH=۷/۴ با آب مقطر به حجم نهایی ۱۰۰ ml رسانده شد. این محیط پس از تقسیم به حجم‌های کوچک ۹ ml در  $70^{\circ}C$ -تا یک سال پایدار می‌باشد. موقع استفاده به غلظت ۰/۲۵ (v/v) زرد تخم مرغ (به ۹ ml از این بافر ۳ ml زرد تخم مرغ تازه) اضافه گردید با این محیط نیز نمونه‌های سینم به صورت ۱:۱ مخلوط شدند (۱۰-۹-۳).

**۳- روش انجام:** روش کلی کار با هر یک از سه محیط بدین ترتیب بود که پس از رساندن محیط‌ها به دمای آزمایشگاه، بر روی یک حجم از مایع سینیال، حجم مورد نیاز از محیط نگهدارنده، قطره قطره و به آرامی (با سرعت حدود ۰/۸ ml/min) به نمونه مایع سینیال

آورده شده است.

براساس این نتایج میانگین درصد تحرک اسپرم قبل از فریز کردن  $۲۹/۸\pm۱۳/۶\%$  بود؛ اما این میانگین پس از ذوب طی روش انجاماد آهسته با دستگاه با محیط‌های HSPM ( $۹/۱\pm۵/۱$ %)، محیط GEYC ( $۹/۱\pm۵/۷$ ) و محیط TYBG ( $۰/۴\pm۴/۷$ ) و نیز طی روش انجاماد در فاز بخار ازت با محیط‌های HSPM ( $۵/۰\pm۵/۱$ %) آهسته با دستگاه (روش برنامه‌ریزی شده) حاصل شد. همانطوریکه جدول شماره ۱ نشان می‌دهد؛ اگرچه تفاوت قابل ملاحظه‌ای در میانگین درصد تحرک اسپرم در محیط HSPM بین دو روش دستگاهی ( $۹/۱\pm۵/۱$ %) و فاز بخار ازت ( $۵/۰\pm۵/۱$ %)؛ وجود ندارد؛ اما میانگین درصد تحرک اسپرم پس از ذوب با دو محیط GEYC و TYBG طی روش انجاماد در فاز بخار ازت نسبت به روش دستگاهی کاهش داشت (به ترتیب  $۱۴/۱\pm۵/۱\pm۱۳/۶$ ٪).

$C^37$  در قرار داده شدند. سپس خامن نی‌ها برداشته شد و با بریدن انتهای دیگر نی نمونه سیمن خارج و مورد ارزیابی و آنالیز قرار گرفت.

۵- آنالیز آماری: آنالیز آماری با استفاده از برنامه SPSS ویرایش ۱۱، آزمون t-test جهت مقایسه تحرک اسپرمها قبل از انجاماد و بعد از ذوب با دو روش مختلف انجاماد و آنالیز واریانس یک طرفه (ANOVA) و آزمون تعقیبی LSD جهت مقایسه تحرک اسپرمها قبل از انجاماد و بعد از ذوب با سه محیط مختلف انجام گرفت. سطح معنی‌داری  $0/۰۵$  در نظر گرفته شد و میزان نمونه‌ها قبل از انجاماد و بعد از ذوب طی دو روش مختلف و با سه محیط مقایسه گردید.

## نتایج

در این مطالعه سه محیط HSPM، TYBG، GEYC طی دو روش مختلف انجاماد مورد ارزیابی قرار گرفتند. تحرک اولیه در ۲۲ نمونه مایع سمینال قبل از انجاماد و بعد از ذوب در جداول و نمودار شماره ۱

جدول ۱- پارامترهای توزیع تحرک مایع سمینال به تفکیک محیط TYBG، GEYC، HSPY و روش انجاماد


		انجاماد به روش غیردستگاهی (%)		انجاماد به روش دستگاهی (%)		انجاماد به روش دستگاهی (%)		قبل از انجاماد (%)	روشها و محیط‌ها	پارامترها
انجاماد در TYBG محیط	انجاماد در GEYC محیط	انجاماد در HSPM محیط	انجاماد در TYBG محیط	انجاماد در GEYC محیط	انجاماد در HSPM محیط					
۱۴/۱۸	۱۴/۱۴	۱۶/۹۵	۱۶/۰۴	۱۶/۳۲	۱۶/۹۱	۴۶/۱۴	میانگین تحرک ( $M\pm SD$ )			
۴/۴۸	۵/۱۰	۴/۵۰	۴/۷۵	۴/۰۷	۰	۸/۳	انحراف معیار تحرک			
۰	۰	۸	۸	۰	۸	۲۰	کمترین تحرک			
۲۳	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵	۶۰	بیشترین تحرک			
۸	۸	۷/۲۰	۷	۳/۰	۷/۲۶	۱۱/۲۰	دامنه بین چارکی*			
۳۰/۱۱±۶/۲۶	۲۹/۱۴±۶/۶۶	۳۶/۲۶±۵/۶۴	۳۴/۱۸±۶/۱۱	۳۴/۲±۶/۴۳	۳۵/۸۹±۵/۷۲	۱۰۰	میانگین CSF پس از ذوب (n=۲۲)			
۱۹/۲	۲۰/۶	۲۲/۸	۲۱/۸	۲۰/۲	۲۴/۲	۵۶	میانگین تحرک در نمونه‌های با تحرک (n=۵)٪ $50>$			
۳۴/۳±۵/۳۲	۳۶/۷۷±۵/۹	۴۰/۷۴±۳/۴۹	۳۸/۹۲±۴/۸۹	۳۵/۹۸±۶/۱۸	۴۳/۲۲±۱/۹۹	۱۰۰	میانگین CSF در نمونه‌های با تحرک (n=۵)٪ $50<$			
۱۲/۷	۱۲/۲۴	۱۵/۲۴	۱۴/۳۵	۱۵/۱۸	۱۴/۷۶	۴۳/۲۴	میانگین تحرک در نمونه‌های با تحرک (n=۱۷)٪ $50>$			
۲۸/۸۸±۶/۱۱	۲۶/۹۱±۵/۱۳	۳۴/۹۵±۵/۳۴	۳۲/۷۹±۵/۸۳	۳۳/۶۸±۶/۰۹	۳۳/۷۳±۴/۴۹	۱۰۰	میانگین CSF در نمونه‌های با تحرک (n=۱۷)٪ $50>$			

\* Inter quartile range

(P=0/05) وجود دارد.

مقایسه میانگین درصد تحرک پس از ذوب اسپرم‌های منجمد شده در محیط GEYC و TYBG به عنوان محیط‌های نگهدارنده، طی روش فاز بخار ازت نشان می‌دهد که تفاوت معنی‌داری بین میانگین‌های درصد تحرک دردو محیط GEYC ( $14/12 \pm 5/14\%$ ) و محیط TYBG ( $14/18 \pm 4/47\%$ ) در روش فاز بخار ازت وجود ندارد. بهر حال میانگین درصد تحرک اسپرم‌های منجمد شده در محیط HSPM به عنوان یک محیط نگهدارنده، اختلاف معنی‌داری را در مقایسه با میانگین درصد تحرک اسپرم پس از ذوب در دو محیط دیگر نشان می‌دهد، بنابراین محیط HSPM، محیط مناسبتری جهت انجاماد اسپرم نسبت به دو محیط GEYC و TYBG می‌باشد.

همچنین زمانیکه تعداد نمونه‌های مایع سمینال به دو گروه با درصد تحرک بالای ۵۰٪ و زیر ۵۰٪ تقسیم گردید. میانگین درصد تحرک اسپرمها برای ۵ نمونه با تحرک بالای ۵۰٪ قبل از انجاماد ۵۶٪ بود؛ ولی میانگین درصد تحرک و میانگین بازده تحرک (یا میزان بقا) HSPM و TYBG (به ترتیب برابر با ۲۴٪ و ۲۶٪) با پس از ذوب طی روش دستگاهی با محیط‌های GEYC و TYBG بازده تحرک ۴۳٪ و ۴۲٪ در محیط HSPM، بازده تحرک میانگین بازده تحرک ۳۵٪ و ۳۲٪ در محیط GEYC و نیز طی روش فاز بخار ازت با محیط HSPM، GEYC و TYBG (به ترتیب برابر با ۴۰٪، ۷۴٪ و ۴۹٪) در محیط HSPM، بازده تحرک میانگین بازده تحرک ۲۰٪ و ۲۱٪ با میانگین بازده تحرک ۳۸٪ در محیط TYBG و نیز طی روش فاز بخار ازت با محیط GEYC، HSPM و TYBG (با ترتیب ۳۶٪، ۳۴٪ و ۳۲٪ در محیط GEYC و ۲۰٪ در محیط TYBG) افزایش چشمگیری نسبت به ۱۷ نمونه با میانگین درصد تحرک زیر ۵۰٪ نشان می‌دهد؛ بطوریکه در ۱۷ نمونه با میانگین درصد تحرک زیر ۵۰٪، میانگین درصد تحرک قبل از انجاماد



نمودار ۱- مقایسه درصد تحرک قبل و بعد از انجاماد به تفکیک محیط و روش انجاماد، مقادیر خارج از محدوده (Outliers) مربوط به نمونه‌های مایع سمینال شماره ۹، ۱۵، ۳۷، ۴۷، مقدار پرت (Extremes) (مایع سمینال شماره ۹).

با محیط GEYC در روش فاز بخار ازت در مقابل همچنین زمانیکه تعداد نمونه‌های مایع سمینال به دو گروه با درصد تحرک بالای ۱۶٪ و زیر ۱۶٪ تقسیم گردید. میانگین درصد تحرک اسپرمها برای ۵ نمونه با تحرک بالای ۵۰٪ قبل از انجاماد ۵۶٪ بود؛ ولی میانگین درصد تحرک و میانگین بازده تحرک (یا میزان بقا) HSPM و TYBG (به ترتیب برابر با ۲۴٪ و ۲۶٪) با میانگین بازده تحرک ۴۳٪ و ۴۲٪ در محیط GEYC و TYBG (P=0/007) وجود دارد. بنابراین روش دستگاهی به عنوان انتخاب اول جهت انجاماد، پیشنهاد می‌شود.

مطالعه حاضر نشان می‌دهد که اگرچه تفاوت قابل ملاحظه‌ای بین میانگین درصد تحرک اسپرم پس از ذوب و مقایسه دو به دوی محیط‌ها طی روش دستگاهی HSPM=۱۶٪ و TYBG=۱۶٪ (GEYC=۱۶٪)؛ اما در روش فاز بخار ازت میانگین درصد تحرک پس از تاوینگ در محیط HSPM (HSPM=۱۶٪ و TYBG=۱۶٪) به عنوان یک محیط نگهدارنده بیشتر از دو محیط GEYC و TYBG (TYBG=۱۶٪ و GEYC=۱۶٪) باشود و تفاوت معنی‌داری (آنالیز واریانس یکطرفه) بین محیط TYBG و دو محیط GEYC و HSPM (P=0/05) وجود دارد.

شده بدست می‌آید؛ بنابراین روش دستگاهی به عنوان انتخاب بهتر جهت انجاماد اسپرم انسان پیشنهاد می‌گردد. مشکل دیگر در روند انجاماد مایع سمینال این است که هنوز محیطی که از آسیب اسپرمها طی روند انجاماد جلوگیری کند، وجود ندارد. آسیب به اسپرم‌های انسان را می‌توان بلا فاصله با کاهش حرکت پس از ذوب تشخیص داد. افزودن ترکیبات نگهدارنده قبل از انجاماد جهت بقا بهتر اسپرمها ضروری است. بیشتر کاهش حرکت اسپرم طی انجاماد و ذوب مجدد به خاطر تماس اسپرم با نگهدارنده‌های محیط می‌باشد (۱۹).

گلیسرول اولین و شایع‌ترین ترکیبی است که به عنوان نگهدارنده محیط انجاماد<sup>۱</sup> با کسب نتایج مختلف برای انجاماد مایع سمینال استفاده می‌شود. گزارشات ابتدایی ثابت کردند که بدون گلیسرول بقا اسپرمها پس از انجاماد کاهش می‌یابد یا به صفر می‌رسد و مطالعات مختلف ضرورت و کارآیی آن را در فرآیند انجاماد آشکار کردند (۲۱-۳۹، ۱۹). عموماً دامنه غلظت ۵٪ تا ۱۰٪ گلیسرول استفاده می‌گردد و غلظت نهایی حدود ۵٪/۷ (۷٪) مطلوب به نظر می‌رسد (۱). غلظت نهایی گلیسرول ممکن است در میزان بقا سلول‌های منجمد تأثیر بگذارد و اثرات سمی گلیسرول حتی در غلظت کمتر از ۲٪ نیز گزارش گردیده است (۲۲). همچنانکه غلظت گلیسرول افزایش می‌یابد، حرکت اسپرم کاهش می‌یابد. به هر حال اثرات سمی محدود گلیسرول روی اسپرمها به صورت آسیب‌های هایپراسموتیک در روند انجاماد مشخص شده است (۲۵-۲۳، ۱۹، ۱۱). در این مطالعه نیز از گلیسرول در هر سه محیط HSPM، GEYC و TYBG استفاده شده است. همانطوریکه میانگین درصد حرکت نشان می‌دهند، این میزان در هر سه محیط نسبت به قبل از انجاماد کاهش معنی‌داری دارد (تا حدود ۳۰٪). غلظت گلیسرول مورد استفاده تأثیر مستقیمی در میزان سمیت گلیسرول دارد (۲۶). اکثر

(P=۰/۰۳٪/۴۲٪/۲۴) بود و نیز میانگین درصد حرکت و میانگین بازده حرکت پس از ذوب طی روش دستگاهی با محیط‌های HSPM (۱۴٪/۷۶) با میانگین بازده حرکت GEYC (۱۵٪/۱۸)، محیط (P=۰/۰۱، ۴۹٪/۷۳±۴) و محیط میانگین بازده حرکت (P=۰/۰۵٪/۶٪/۲۲) با میانگین بازده حرکت TYBG (۱۴٪/۳۵) و نیز طی روش غیردستگاهی با محیط‌های مذکور به ترتیب HSPM (۱۵٪/۲۴) با میانگین بازده حرکت (P=۰/۰۱، ۳۴٪/۹۵±۵)، محیط GEYC (۱۲٪/۲۴) با میانگین بازده حرکت (P=۰/۰۰۴، ۲۶٪/۹۱±۵) و محیط TYBG (۱۲٪/۷) با میانگین بازده حرکت (P=۰/۰۲، ۲۸٪/۸۸±۶) می‌باشد.

## بحث

مطالعات زیادی نشان داده‌اند که روند انجاماد و ذوب مجدد نمونه مایع سمینال سبب کاهش فعالیت متابولیک اسپرمها و آسیب به غشای پلاسمایی آنها و در نتیجه کاهش اسپرم‌های دارای عملکرد طبیعی جهت استفاده در روش‌های لقاح خارج رحمی می‌گردد (۱۵، ۱۴). بنابراین، استفاده از نگهدارنده‌های مناسب و روش صحیح انجاماد در حفظ و سلامت اسپرم بسیار مهم تلقی می‌گردد (۱۴).

برخی محققین نشان داده‌اند که روش‌های انجاماد دستگاهی، کیفیت اسپرم را بهتر از انجاماد با استفاده از فاز بخار حفظ می‌کند (۱۷، ۱۶). اما برخی دیگر هیچ اثر مثبتی، حداقل برای اسپرم‌های انسان یافت نکرده‌اند (۱۸). در مطالعه حاضر نشان داده شد که انجاماد به روش برنامه‌ریزی شده آهسته (دستگاهی)، بهتر از انجاماد در فاز بخار ازت مایع (غیردستگاهی) می‌تواند به عنوان روشی جهت انجاماد اسپرم به کار رود. همانطوریکه داده‌ها نشان می‌دهند بهترین حرکت اسپرم پس از ذوب در روش انجاماد دستگاهی و برنامه‌ریزی

۱- Cryoprotectant

گردیده است. بنابراین بنظر می‌رسد که محیط GEYC و HSPM نسبت به محیط TYBG از نظر حفظ فشار اسمزی خارج سلولی دارای نگهدارنده‌های بهتری باشد. از آنجاییکه قند فروکتوز منبع انرژی برای اسپرمها می‌باشد، پیشنهاد می‌گردد جهت فشار اسمزی خارج سلولی و نیز به درجاتی ضعیفتر جهت حفظ انرژی برای اسپرمها از مجموعه‌های ترکیبات گلوکز، سوکروز، فروکتوز و گلایسین استفاده گردد که در مطالعه آینده ما در تهیه نگهدارنده محیط انجاماد مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. آنچه که به طور عمومی پذیرفته شده است این است که رقیق‌کننده‌های هایپرتونیک بهتر از رقیق‌کننده‌های هایپوتونیک هستند (۳۲). تأثیر دهیدراتاسیون رقیق‌کننده‌های هایپرتونیک ممکن است شانس تشکیل کریستال‌های یخ داخل سلولی را کاهش دهد (۲۴). مطالعات Mahadevan و همکاران (۱۹۸۳) نشان داد که افزودن سوکروز و گلایسین، در مقایسه با محیط ایزوتونیک MTM<sup>۲</sup> سبب بهبود بقا اسپرم‌های انسان گردید (۱۰).

بافر بودن محیط‌های انجاماد اسپرم جهت اجتناب از آسیب به اسپرم ضروری می‌باشد (۱). زرده تخمرغ به عنوان ترکیبی از فسفولیپید، لیپوپروتئین، کلسترول و تعداد متنوعی از ترکیبات دیگر به همراه بافر سیترات و TYBG بافر دو یونی TES-Tris که در محیط GEYC و TYBG به کار رفته‌اند، برای انجاماد استفاده می‌شوند. بافرهای دو یونی حاوی زرده تخمرغ، گلوکز و گلیسرول به صورت وسیع برای تهیه محیط‌های انجاماد اسپرم در گونه‌های مختلف پستانداران متداول شدند (۳۴). در محیط GEYC حاوی زرده تخمرغ بافر بودن محیط توسط سیترات و گلایسین تأمین می‌گردد. اما اخیراً ترکیبی از بافرهای دو یونی TES و Tris به همراه زرده تخمرغ (محیط TYBG) و معمولاً به همراه گلیسرول استفاده می‌گردد (۱). بافر دو یونی دیگر Hepes

محققین غلظت اپتی مم گلیسرول را جهت کسب نتایج بهتر بقاء اسپرم‌های انسان ۱۰-۵٪ پیشنهاد کرده‌اند (۳۱، ۳۰، ۲۷). غلظت نهایی گلیسرول در محیط GEYC به میزان ۱۰/۶٪ و در محیط HSPM نسبت ۴٪ بود ولی در محیط HSPM به میزان ۷/۵٪ می‌باشد؛ لذا احتمالاً یکی از دلایل بهتر بودن محیط HSPM نسبت به دو محیط دیگر در این مطالعه، میزان غلظت کمتر گلیسرول مورد استفاده باشد. بنابراین پیشنهاد می‌گردد که حداکثر تا میزان ۱۰٪ غلظت گلیسرول در تهیه محیط انجاماد استفاده گردد.

مطالعات فراوانی انجام گرفته است تا تأثیر نگهدارنده‌های مختلف محیط‌های انجاماد نظری زرده تخمرغ، شیر، بافرهای دو یونی (دارای یون‌های مثبت و منفی)<sup>۱</sup>، سیترات، فروکتوز، بافر تریس، گلوکز، دکسترونز، گلایسین را روی اسپرم مورد ارزیابی قرار دهند (۲۶). قندها، عمومی‌ترین ترکیبات مورد استفاده در محیط‌های انجاماد سیمین جهت روند انجاماد هستند (۳۲، ۲۴). اثرات مفید قندها احتمالاً بخاطر حفظ فشار اسمزی مایع خارج سلولی در حرارت مختلف طی انجاماد و یا به عنوان منبع انرژی جهت متابولیسم اسپرمها می‌باشد. به هرحال به دلیل اینکه مایع سمنیال انسان بلا فاصله پس از جمع‌آوری رقیق و منجمد شده و پس از ذوب سریعاً مواد نگهدارنده آن شستشو می‌گردد، احتمال نقش قندها به عنوان منبع انرژی برای متابولیسم اسپرمها بسیار ضعیف می‌باشد. احتمالاً حفظ فشار اسمزی خارج سلولی توضیحی جهت توانایی رافینوز، گلوکز و سوکروز به عنوان مکمل‌های محیط برای اسپرم‌های انسان باشد (۱۰). از ترکیبات TYBG حفظ‌کننده فشار اسمزی خارج سلولی در محیط TYBG تنها از دکسترونز استفاده شده است؛ ولی در محیط GEYC از گلوکز، فروکتوز و گلایسین و در محیط HSPM نیز از گلوکز، سوکروز و گلایسین استفاده

طی انجاماد و ذوب مجدد در حضور گلیسرول دارد (۱۰). برخی شواهد وجود دارند که نقش حفاظتی آلبومین را نشان می‌دهند (۳۷، ۳۸) و لذا مشخص می‌شود که حضور آلبومین سرم انسان و سوکروز (در محیط HSPM) نقش حفاظتی مشابه یا بهتری در مقایسه با محیط حاوی زردہ تخم مرغ در حضور گلیسرول (مثل GEYC) برای اسپرم‌های انسان دارد (۱۰). مطالعه حاضر نیز این گفته را تایید می‌کند و نشان می‌دهد که محیط HSPM حاوی آلبومین سرم انسانی به عنوان منبع پروتئین، نقش حفاظتی بهتری نسبت به دو محیط دیگر حاوی زردہ تخم مرغ دارد.

استفاده از سیترات در تهیه بافرهای محیط انجاماد به این دلیل است که مایع سیمن یک بافر بی‌کربنات-فسفات شبیه سرم خون نیست بلکه یک بافر بی‌کربنات-سیترات است (۹). امروزه محیط‌های انجاماد اسپرم از خاصیت بافری ترکیبات مایع منی تقليد نمی‌کنند؛ زیرا سیترات در pH بین ۷/۴-۷/۲ بافر ضعیفی بوده و بی‌کربنات نیز در مدت کوتاهی به صورت گاز وارد اتمسفر می‌شود. در عوض بیشتر محیط‌های کشت بافت هنوز هم به تقليد از سرم خون، حاوی بی‌کربنات هستند. مطالعات Brotherton و همکاران نشان می‌دهد که می‌توان بافر Hepes را به عنوان بافری پایدار جایگزین بی‌کربنات پیشنهاد کرد. استفاده از محیط‌های بافت حاوی بافر فسفات استاندارد که حاوی معرف فنرده به عنوان نشانگر pH هستند، راه خوبی جهت مطمئن بودن از pH خنثی نمونه‌های سیمن می‌باشد. خروج یون‌های بی‌کربنات اسیدی به آتمسفر سبب می‌گردد تا pH به بالای ۸ رسیده و رنگ محیط خصوصیت ارغوانی پیدا کند (۳). در این مطالعه مایع سیمن در همان بافری که جهت کشت تخمک استفاده می‌شود (یعنی بافر Hepes)، با اضافه کردن گلیسرول، به همراه آلبومین سرم به عنوان منبع پروتئین و بدون زردہ تخم مرغ، منجمد گردید و نتایج موفقیت آمیزی در IVF به دست آمد. این

می‌باشد که به همراه آلبومین انسانی در محیط HSPM کاربرد دارد. چندین سال است که تأثیر زردہ تخم مرغ در حفظ اسپرم در حرارت پایین شناخته شده است، ولی مکانیسمی که توسط آن، زردہ تخم مرغ اسپرمها را از شوک سرما حفاظت می‌کند، هنوز به وضوح شناخته نشده است. زردہ تخم مرغ اسپرمها را از اثرات تخریب کننده دمای پایین حفظ می‌کند و می‌تواند تغییرات ارگان‌های مهم در تحرک و متابولیسم اسپرم را کاهش دهد. پیشنهاد شده است که پایدار کردن غشاء اسپرم و یا حفظ فشار کلوئیدی محیط خارج سلولی ممکن است توسط محیط حاوی زردہ تخم مرغ مورد تأثیر قرار گیرد. وجود ترکیبات لیپوپروتئینی با دانسته پایین را نیز می‌توان به عنوان یک حمایت کننده در برابر شوک سرما به هنگام انجاماد و ذخیره‌سازی در سرما، در نظر گرفت. احتمال می‌رود که بخش فسفولیپیدی، با دانسته پایین موجود در زردہ تخم مرغ سبب حفاظت اسپرمها طی تماس با حرارت پایین شوند و احتمال می‌رود که یک تعویض لیپیدی بین اسپرمها و زردہ تخم مرغ و یا تأثیر محیط اشباع از اسید چرب، رخ داده باشد (۱۴). زردہ تخم مرغ که اغلب در محیط‌های نگهدارنده انجاماد جهت اسپرم‌های انسان مورد استفاده قرار می‌گیرد، علاوه بر اینکه یک محیط نگهدارنده انجاماد به شمار می‌رود؛ بلکه سبب حفظ و انسجام بهتر غشای پلاسمایی اسپرم می‌گردد. در واقع برخی از محققین گزارش کرده‌اند که با استفاده از زردہ تخم مرغ در غیاب گلیسرول می‌توان طول عمر و بقا مناسبی را به دست آورد (۳۵). Sawada، Emmens، Blockshaw و Brotherton نشان دادند که اضافه کردن زردہ تخم مرغ، مایع فولیکولی انسان، سرم خون انسان، شیر انسان یا گاو به مایع سیمن حاوی گلیسرول باعث افزایش بقاء اسپرمها می‌گردد (۲۹، ۳۶). مطالعات Mahadevan و همکاران نشان می‌دهد که بعضی ترکیبات در مایعات بیولوژیکی (احتمالاً آلبومین) اثرات مفیدی در طول عمر اسپرمها

محیط نگهدارنده بهتری نسبت به HSPM می‌باشد<sup>(۹)</sup>. همچنین مطالعات McCoshen و همکاران نشان داد که استفاده از اسپرم‌های منجمد شده در محیط TYB-G، با توجه به نتایج حاملگی مشابه مایع سیمن تازه می‌باشد<sup>(۴۱)</sup> که ممکن است بخاطر طول عمر مناسب اسپرمها در محیط‌های مورد استفاده باشد<sup>(۹)</sup>.

مطالعه دیگری نشان داد که باروری مایع منی منجمد شده در محیط HSPM و یا GEYC تفاوت معنی‌داری نداشت؛ ولی درصد سیکل منتج به حاملگی برای نمونه‌های منجمدشده در محیط HSPM در مقایسه با محیط GEYC بالاتر بود<sup>(۱۰)</sup> و لذا پیشنهاد شده است GEYC که از این محیط به عنوان رقیق‌کننده نسبت به استفاده گردد. منافع HSPM شامل اینکه، برخلاف TYBG و HSPM، محیط GEYC استریل بوده، از نظر شیمیایی محیط تعریف شده‌ای بود و محتوی زرده تخم مرغ و یا هرگونه پروتئین‌های غیرانسانی نمی‌باشد و این به معنی اجتناب از آنتی‌بادی‌های احتمالی در پاسخ به تلقیح داخل رحمی اسپرم حاوی این پروتئین‌هاست. جالب است که یادآوری شود که Griffin و همکاران گزارش کرده‌اند که آنتی‌بادی‌های پروتئین‌های زردۀ تخم مرغ به دنبال تلقیح مکرر در Park گاوها مشاهده شده است<sup>(۴۲)</sup>. به هرحال Hunter گزارش کرده‌اند که نه تولید آنتی‌بادی و نه باروری هیچ کدام با تلقیح گاو توسط تنها زردۀ تخم مرغ به عنوان رقیق‌کننده تحت تأثیر قرار نگرفته بودند<sup>(۴۳)</sup>. برخلاف GEYC، نیاز به آماده‌سازی HSPM به صورت تازه و به طور هفتگی و یا در فاصله‌های زمانی کوتاه نیست. HSPM را می‌توان در ۲۰°C- برای حداقل ۳ ماه نگهداری کرد؛ اگرچه Jondet گزارش کرده است که محیط GEYC را نیز می‌توان برای چند ماه به صورت یخ زده ذخیره نمود<sup>(۴۴)</sup>. تولید تجاری HSPM و یا در فاصله‌های زمانی کوتاه عملی است. تعیین درصد تحرک اسپرم منجمد شده بعد از روند انجاماد در

محیط، محیطی است که امروزه ترجیح داده می‌شود<sup>(۳)</sup>. اما نتایج حاضر از بهتر بودن محیط HSPM نسبت به محیط TYBG مخالف دسته دیگر از مطالعاتی است که در مقایسه این دو محیط انجام شده است. مطالعات Prins و همکاران نشان می‌دهند که از میان سیستم‌های بافری تست شده، TYB-G دارای گلیسروول دارای بهترین بازده تحرک اسپرم انسان پس از ذوب می‌باشد. به نظر می‌رسد که نسبت یک ترکیب اختصاصی در هر محیط دارای اهمیت حیاتی باشد؛ زیرا استفاده از محیط TYB-G علی‌رغم تفاوت در نسبت ترکیبات محیط مثل گلیسروول یا زردۀ تخم مرغ، نتایج مشابهی را نشان می‌دهند. اختلاف اساسی بین محیط TYB با گلیسروول و بدون گلیسروول نشان می‌داد که وجود گلیسروول به عنوان یک ماده نگهدارنده در انجاماد در این محیط جهت بقاء مناسب پس از انجاماد حیاتی و ضروری می‌باشد. بازده بهتر اسپرمها زمانی مشاهده شد که از بافر TEST استفاده شد که احتمالاً بخاطر ظرفیت این بافر در برداشتن یون‌های هیدروژن در محیط اطراف و لذا کمک به روند دهیدراتاسیون باشد. بافر دیگر تست شده در این مطالعه بافر Hepes دارای گلیسروول بوده که افزایش بقاء اسپرمها را نشان داد؛ اگرچه بازده آن برای اسپرم‌های انسان بخوبی سیستم بافری حاوی گلیسروول نبوده است. بهر حال در مقایسه مستقیم با سیستم بافری TEST، دو سیستم بافری در محیط‌های HSPM حاوی ۱۵٪ (۷/۷) گلیسروول که به نسبت ۱:۱ با نمونه مایع سمنیوال مخلوط گردیده و محیط GEYC دارای بازده اسپرم کمتری بوده‌اند<sup>(۹)</sup>. مطالعات McGonagle و همکاران نیز نشان می‌دهند که محیط G-TYB بهتر از محیط GEYC جهت حفظ تحرک و حیات اسپرم می‌باشد<sup>(۳۴)</sup>. در ضمن نشان داده شده است که محیط TYB-G تاثیر مثبتی روی کیفیت اسپرم از نظر تحرک و ظرفیت باروری دارد<sup>(۴۰)</sup> و Mطالعات Prins و همکاران نشان می‌دهد که محیط TYB

مساوی یا کمتر از ۵۰٪ قبل از انجاماد و بعد از انجاماد با استفاده از هر یک از محیطها و روش‌های انجاماد وجود دارد ( $P<0.05$ ). پس اگر از مایع سمنیال تازه با بیش از ۵۰٪ تحرک اولیه جهت انجاماد استفاده گردد، بازده بالاتری را پس از انجاماد و ذوب مجدد نشان خواهد داد. گزارشات Brotherton و همکاران نیز نشان می‌دهد که تحرک اسپرم‌اتوزوئید انسان چه درصد تحرک و چه سرعت آن، در مایع انزالی تازه بستگی به شمارش اسپرم و درصد مورفولوژی طبیعی دارد. به جز در تعدادی موارد غیرطبیعی، زمانیکه شمارش اسپرم بالا باشد، درصد تحرک نیز بالا می‌باشد. همچنانکه نمونه‌های مایع سمنیال بتدریج ضعیفتر می‌شوند، شمارش اسپرم، تحرک و مورفولوژی همگی کاهش می‌یابند؛ چرا که اینها پارامترهای جداگانه‌ای نیستند و همگی با همیگر منعکس‌کننده کیفیت مایع انزال هستند.

### نتیجه‌گیری

با توجه به بحث مذکور می‌توان نتیجه‌گیری کرد که روش برنامه‌ریزی شده آهسته (دستگاهی) بهتر از انجاماد در فاز بخار ازت مایع (غیردستگاهی) جهت انجاماد اسپرم بوده و همچنین محیط HSPM به دلیل غلظت کمتر گلیسروول، حفظ فشار اسمزی مناسب، استفاده از بافر دویونی مناسب، استفاده از آلبومین سرم انسانی به عنوان منبع پروتئین و استفاده از محیط نگهدارنده مناسب، بهتر از دو محیط GEYC و TYBG جهت انجاماد اسپرم می‌باشد.

### تشکر و قدردانی

بدینوسیله از همکاران محترم پژوهشکده ابن‌سینا و مرکز درمان ناباروری ابن‌سینا که ما را در انجام این مطالعه یاری نمودند قدردانی می‌شود.

محیط HSPM بدلیل دانسیته پایین‌تر آسانتر از محیط GEYC می‌باشد (۱۰).

محیط HSPM مورد استفاده در این مطالعه دارای  $pH=6/5$  می‌باشد که کمتر از دو محیط دیگر ( $pH=7/4$ ) می‌باشد. اگرچه اکثر محققین استفاده از محیط‌های انجاماد با  $pH=7/4$  تا  $pH=7$  را پیشنهاد کرده‌اند؛ اما گزارشی از تأثیر  $pH=7-7/4$  روی بقاء اسپرم‌های انسان گزارش نگردیده است (۱۰). با این وجود  $pH$  اپتیم محیط HSPM در حدود  $6/5-7$  بود و Foote و همکاران گزارش کرده‌اند که  $pH=6/5$  در بافر رقیق‌کننده محتوی Tris سبب افزایش باروری با مایع سیمن منجمد شده گاو شده است (۴۵). اگرچه دلیل این امر شناخته شده نیست اما ممکن است مربوط به تغییرات واضح  $pH$  در طی روند انجاماد باشد (۴۶) و لذا کمتر بودن  $pH$  مورد نظر در محیط HSPM احتمالاً بتواند دلیل دیگری برای بهتر بودن این محیط نسبت به محیط‌های GEYC و TYBG جهت انجاماد اسپرم باشد.

نتایج Stanic و همکاران ثابت می‌کند که در صورتیکه افرادی با معیارهای اسپرم‌وگرام استاندارد اهداء کننده باشند، استفاده از مایع منی منجمد شده برای تلقیح مصنوعی می‌تواند نتایج بهتری را به همراه داشته باشد؛ زیرا بهبود تحرک در مایع منی منجمد شده ممکن است کارایی و بازده باروری را افزایش دهد (۱۱). در این مطالعه نیز جهت بررسی تأثیر تحرک اولیه اسپرم در بازده تحرک (میزان بقاء) پس از انجاماد، نمونه‌های مایع سمنیال در دو گروه با درصد تحرک بالاتر از ۵۰٪ و مساوی یا کمتر از ۵۰٪ بصورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی نتایج ما نیز مطالعه مذکور را تایید می‌کند و نشان می‌دهد که تفاوت معنی‌داری بین میانگین بازده تحرک با میزان بقاء نمونه‌های با بیش از ۵۰٪ تحرک اولیه و نمونه‌های با درصد تحرک اولیه

## References

- 1- Mortimer D. Practical Laboratory Andrology. Oxford University Press incorporated. Chapt. 14, Semen cryopreservation.1994;pp:301-323.
- 2- Shaw J.M., Oranratnachai A., Trounson A.O. Cryopreservation of oocytes and embryos. Chapter 16. In: Handbook of Invitro Fertilization Second Edition. Edited by Alan O. Trounson and David K. Gardner. CRC press Inc.2000.
- 3- Brotherton J. Cryopreservation of human semen. Arch of Androl.1990;25:181-195.
- 4- Mahony M.C., Morshedi M., Scott R.T., De Villiers A. Erasmus E. Role of spermatozoa cryopreservation in assisted reproduction. In: human spermatozoa in assisted reproduction. Edited by Acosta A.A., Swanson R. J., Ackerman S.B., kruger T.A.F., Van Zyl J.A., and Menkeld R. Baltimore: Williams & wilkins Co., Chapt. 10, pp:100,1990.
- 5-Anger J.T., Gilbert B.R. Goldstein M. Cryopreservation of sperm: Indications, Methods and Results. J Urol. 2003;170:1079-1084.
- 6- Jahnel F. Über die widerstandsfähigkeit von menschlichen spermatozoan gegenüber starke kalte. Klin Wschr.1937;17:1273-1275.
- 7- Polge G., Smith A.U., Parkes A.S. Retrieval of (bovine) spermatozoa after vitrification and dehydration at low temperatures. Nature.1949; 164:666-669.
- 8- Bunge R.G., Sherman J.K. Fertilizing capacity of frozen human spermatozoa. Nature.1953;172: 767.
- 9- Prins G.S., Weidel L. A comparative study of buffer systems as cryoprotectants for human spermatozoa. Fertil Steril.1986;46(1):147-149.
- 10- Mahadevan M., Trounson A.O. Effect of cryoprotective media and dilution methods on the preservation of human spermatozoa. Andrologia.1983;15(4):355-366.
- 11- Stanic P., Tandara M., Sonicki Z., Simunic V., Radakovic B., Suchanek E. Comparison of protective media and freezing techniques for cryopreservation of human semen. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol.2000;91: 65-70.
- 12- Nallella K.P., Sharma R.K., Allamaneni S.S.R., Aziz N., Agarwal A. Cryopreservation of human spermatozoa: comparison of two cryopreservation methods and their cryoprotectants. Fertil Steril.2004;82(4):913-918.
- 13- Gardner D.K., Weissman A., Howles C.M., Shoham Z. Assisted Reproductive Techniques. Chapt. 5: Evaluation of sperm.2001;P:61-76.
- 14- Hammadeh M.E., Georg T., Rosenbaum P., Schmidt W. Association between freezing agent and acrosome damage of human spermatozoa from subnormal and normal semen. Andrologia. 2001;33:331-336.
- 15- Baratz S.L., Rothschild E., Grach B., Koifman M., Shiloh H., Ishai D. Dirnfeld M. The value of sperm pooling and cryopreservation in patients with transient azoospermia or severe oligoasthenoteratozoospermia. Hum Reprod.2002;17(1):157-160.
- 16- McLaughlin E.A., Ford W.C.L., Hull M.G.R. A comparison of the freezing of human semen in the uncirculated vapour above liquid nitrogen and in a commercial semi programmable freezer. Hum Reprod.1990; 5:724-8.
- 17- Ragni G., Caccamo A.M., Dalla Serra A., Guercilena S. Computerized slow staged freezing of semen from men with testicular tumors or Hodgkin's disease preserves sperm better than standard vapor freezing. Fertil Steril.1990;53: 1072-5.
- 18- Thachill J.V., Jewett M.A.S. Preservation techniques for human semen. Fertil Steril.1981; 35:546-8.
- 19- Critser J.K., Kuse Benda A.R., Aaker D.V., Arneson B.W., Ball G.D. Cryopreservation of human spermatozoa III. The effect of cryoprotectants on motility. Fertil Steril.1988;50:314-20.
- 20- Serafini P., Mars R.P. Computerized stage-freezing technique improves sperm survival and preserve penetration of zona-free hamster ova. Fertil Steril.1986;45: 854-858.
- 21- Critser J.K., Arneson B.W., Aaker D.V., Huse-Benda A.R., Ball G.D. Cryopreservation of human spermatozoa II. Postthaw chronology of motility and of zona-free hamster ova penetration. Fertil Steril.1987;47:980-984.
- 22- Tulandi T., McInnes R.A. Vaginal Lubricant: effect of glycerol and egg white on human sperm motility and progression in vitro. Fertil Steril 1984;41:151-153.
- 23- Weidel L., Prins G.S. Cryopreservation of human spermatozoa frozen in eight different buffer system. J Androl.1987;8:41-47.
- 24- Watson P.F. The preservation of semen in mammals. In: Oxford reviews of reproductive biology. Finn CA (Eds) Oxford University Press, Oxford.1979;pp:283-350.
- 25- Gao D.Y.,Ashworth E.,Watson P.F.Hypersmotic tolerance of human spermatozoa: separate effects of glycerol, sodium chloride and sucrose on spermolysis. Biol Reprod.1993;49:112-113.
- 26- Jezek D., Schulze W., Kalanj-Bognar S., Vukelic Z., Milavec-Puretic V., krhen I. Effects of various cryo preservation media and freezing thawing on the morphology of rat testicular biopsies. Andrologia.2001; 33:368-378.

- 27- Sawada Y. preservation of human semen by deep freezing. *Int J Fert.*1964;9:525-532.
- 28- Sawada Y., Ackerman D.R. Use of frozen semen. In: S.J. Behrman and R.W. Kistner (Editors) *Progress in Infertility*. Boston: Little Brown.1968;pp:731-748.
- 29- Jeyendran R.S., Graham E.F. An evaluation of cryoprotective compounds on bovine spermatozoa. *Cryobiology*.1980;17:458-464.
- 30- Polge C. Freezing of spermatozoa. In: Ashwood Smith and J. Farrant (Eds): *Low temperature preservation in medicine and biology*. Bath: Pitman.1980; pp:45-64.
- 31- Richardson D.W. Techniques of sperm storage. In: *Artificial insemination*. R.C.O.G., London.1976;pp: 97-125.
- 32- Mann T. Biochemistry of semen and of the male reproductive tract. London. Methuen. (2<sup>nd</sup> Edition).1964.
- 33- Graham E.F., Crabo B.E., Brown K.L. Effect of some zwitterions buffers on the freezing and storage of spermatozoa. *J Dairy Sci.*1972;55:372-8.
- 34- Mc Gonagle L.S., Goldstein M., Feldschuh J. Foote R.H. The influence of cryoprotective media and processing procedures on motility and migration of frozen thawed human sperm. *Asian J Androl.*2002; 4:137-141.
- 35- Sherman J.K. Cryopreservation of human semen. In: Keel B.A., Webster B.W. (Editors); *CRC Handbook of the laboratory Diagnosis and Treatment of infertility*. CRC press. Boca Raton, FL.1990.
- 36- Emmens C.W., Blackshaw A.W. Artificial insemination. *Physiol Rev.*1971;36: 227-306.
- 37- Luyet B., Masat R. On the cryoprotective action of albumin on erythrocytes. *Cryobiology*. 1967;3:370.
- 38- Glaub J.C., Milis R.N., Katz D.F. Improved motility recovery of human spermatozoa after freeze preservation via a new approach. *Fertil Steril.*1976;27:1283-1291.
- 39- Katayama K.S., Stehlik E., Roesler M., Jeyendran R.S., Holmgren W.J., Zaneveld L.J. Treatment of human spermatozoa with an egg yolk medium can enhance the outcome of in vitro fertilization. *Fertil Steril.*1989; 52:1077-1079.
- 40- Barak Y., Amit A., Lessing J., Paz G., Homonnai Z., Yogeve L. Improved fertilization rate in an in vitro fertilization program by egg yolk-treated sperm. *Fertil Steril.*1992;58:197-198.
- 41-McCoshen J.A., Wodzicki A., Tyson J.E. Effectiveness of human semen frozen in TESE-yolk- buffered medium on AID outcome. *Fertil Steril.*1984;42:164.
- 42- Griffin J.E.T., Nunn W.R., Hartigan P.J. An immune response to egg yolk semen diluent in dairy cows. *J Reprod Fert.*1971;25:193-199.
- 43-Park Y.W., Hunter A.G. Effect of repeated inseminations with egg yolk semen extender on fertility in cattle. *J. Dairy Sci.*1977;60:1645-1649.
- 44- Jondet M. Congelation du sperme humain. *Bull Acad Vet.*1976;49:373-384.
- 45- Foote R.H. Fertility of bull semen at high extension rates in Tris buffered extenders. In: *Reproduzione animale e fecondazione artificiale*. Bologna: Edizione Agricole. 1972;pp:99-105.
- 46- Van den Berg L., Rose D. Effect of freezing on the pH and composition of sodium and potassium phosphate solution: the reciprocal system  $\text{KH}_2\text{PO}_4$ -  $\text{Na}_2\text{HPO}_4$ -  $\text{H}_2\text{O}$ . *Arch Biochem Biophys.*1959;81:319-329.