

بررسی عوامل تنفس زا و راهبردهای مقابله‌ای زنان نابارور مراجعه کننده به مرکز

آموزشی درمانی الزهرا تبریز سال ۱۳۷۷

فائزه محمدی حسینی (M.Sc.)^۱، لعیا فرزدی (M.D.)^۲، نعیمه سید فاطمی (M.Sc.)^۳.

- ۱- کارشناس ارشد مامائی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تبریز، ایران.
- ۲- استادیار، گروه زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تبریز، ایران.
- ۳- عضو هیئت علمی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

مشکل ناباروری در دنیای امروز بصورت یک نگرانی اجتماعی درآمده و بسیاری از زوجین در طول سالهای باروری خود به نوعی مشکل ناباروری را تجربه می‌کنند. این مسئله ضربه روانی شدیدی را به زوجین وارد ساخته و روابط زناشویی، بین فردی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بدین منظور این پژوهش که یک مطالعه توصیفی است برای بررسی عوامل تنفس زا و راهبردهای مقابله‌ای برای زنان نابارور مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی الزهرا تبریز در سال ۱۳۷۶ انجام گرفت. هدف از این مطالعه بررسی عوامل تنفس زای جسمی، روانی و اجتماعی و راهبردهای مقابله‌ای متصرکز بر عاطفه در زنان نابارور می‌باشد. در این پژوهش تعداد ۱۵۰ زن نابارور با روش نمونه‌گیری آسان انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات بوسیله مصاحبه منظم و با کاربرد پرسشنامه‌ای سه قسمتی جمع‌آوری شد. بخش اول در مورد مشخصات فردی اجتماعی، روشهای تشخیصی و درمانی انجام گرفته و علت ناباروری، بخش دوم مربوط به تعیین عوامل تنفس زای جسمی و روانی اجتماعی و بخش سوم مربوط به تعیین راهبردهای مقابله‌ای زنان نابارور بود. برای ارزیابی یافته‌های تحقیق از نوع روش آماری آزمون مجدور کای استفاده گردید.

نتایج این مطالعه نشان داد که خستگی ناشی از رفت و آمد مکرر به درمانگاه با تنفس زیاد (۶۷/۳٪) بیشترین عامل تنفس زای جسمی بوده است. نگرانی در مورد نتیجه بخش بودن درمان با تنفس زیاد و خیلی زیاد (۸۷/۳٪) بیشترین عامل تنفس زای روانی اجتماعی شناخته شد. از بین راهبردهای مقابله‌ای ۷۹/۲٪ افراد شرکت کننده در پژوهش دعا کردن را همیشه بکار بردند. دعا کردن با ۷۹/۳٪ پاسخ همیشه بیشترین راهبرد مقابله‌ای متصرکز بر عاطفه بوده و قبول موقعیت با ۷۴٪ پاسخ همیشه بیشترین راهبرد مقابله‌ای متصرکز بر مسئله مورد استفاده بوده است.

گل واژگان: عوامل تنفس زا، راهبردهای مقابله‌ای، ناباروری و زنان نابارور.

آدرس مکاتبه: فائزه محمدی حسینی، گروه زنان و مامائی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تبریز، تبریز، ایران.

پست الکترونیک: aself@yahoo.com

مقدمه

شدید برای زوجین نابارور می باشدند (۵،۹). شواهد موجود نشان می دهد که ناباروری زنان و مردان را به شکل های متفاوتی تحت تاثیر قرار می دهد و زنان از نظر روانی بیش از مردان تحت تاثیر قرار می گیرند (۵،۸). Hirxsch و همکاران (۱۹۹۵) در مطالعه خود دریافتند که زنان از نظر روانی بیش از مردان تحت تاثیر قرار می گیرند (۴)، از سوی دیگر اغلب روشهای درمانی بر روی زنان انجام گرفته، به همین دلیل بیشتر مستعد اضطراب و افسردگی می شوند (۹،۸).

با توجه به اینکه باروری به لحاظ فرهنگی و اجتماعی از اهمیت فوق العاده ای (خصوصیت برای زنان) برخوردار است، مطالعه پدیده ناباروری به خصوص با تکیه بر جنبه های جسمی، روانی و اجتماعی آن از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. مقاله حاضر از یک طرف عوامل تنش زای جسمی، روانی و اجتماعی زنان نابارور را مورد بررسی قرار داده و از طرف دیگر راهبردهای مقابله ای متمرکز بر عاطفه را که توسط زنان نابارور بکار گرفته می شود مورد بحث قرار می دهد تا از یک طرف زوجهای مبتلا به ناباروری را مورد حمایت روانی، اجتماعی بیشتری قرار داده و هم با استفاده از بهترین راهبردهای مقابله ای بتوانند بر مسئله ناباروری و عوارض آن فایق آیند.

مواد و روشهای

این پژوهش از نوع توصیفی بوده و در آن تعداد ۱۵۰ نفر از زنان نابارور مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی الزهرا تبریز بر اساس نمونه گیری آسان انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. تعداد افراد نمونه با استفاده از فرمول $n = \frac{P(1-p)z^2}{d^2}$ ، با کمک داده های: $P=0.11$ ، $d=0.05$ ، $z_{\alpha}=1.96$ ، $\%95$ ، با درجه اطمینان $\%95$ (حداکثر اشتباہ قابل قبول) محاسبه گردید. از طریق مصاحبه منظم و با استفاده از ابزار گردآوری داده ها که

در دنیای پیشرفته مشکل ناباروری در حال افزایش بوده و بصورت یک نگرانی اجتماعی درآمده است (۱). در سال ۱۹۸۸ در کنفرانس بین المللی ناباروری بانکوک، ناباروری بعنوان یک مشکل بهداشتی جهانی با ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی توصیف شده است (۱). شیوع کلی ناباروری در امریکا ۱۰-۱۵ درصد برآورد شده که در حدود ۵۰ درصد موارد ناباروری مربوط به اختلال در زنان ذکر شده است (۲-۳).

طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی (WHO) تخمین زده می شود که حدود ۸ درصد از زوجین در طول سالهای باروری خود، به نوعی مشکل ناباروری را تجربه می کنند. به عبارت دیگر در سراسر دنیا ۵۰-۸۰ میلیون نفر به شکل اولیه یا ثانویه دچار مشکل ناباروری می باشند (۱-۲).

ناباروری و درمان آن یک بحران عمده در زندگی است که سالهای متتمادی طول می کشد (۴). این رویداد تنشی جدی در زندگی محسوب شده و ضربه روانی شدیدی را بر زوجین وارد می سازد (۴-۵). این تنش بر روابط بین فردی، اجتماعی و زناشویی تاثیر گذاشته و می تواند منجر به عدم تعادل روانی زوجین، طلاق و قطع رابطه بین آنها گردد (۶،۴). در جوامع مختلف، بدلیل اینکه داشتن فرزند یک ارزش فردی، اجتماعی و فرهنگی محسوب می شود زوجین نابارور کوشش فراوانی را صرف تشخیص و درمان ناباروری می کنند (۷،۵) و در عین حال بدلیل اثرات جسمی، روانی و اجتماعی درمان ناباروری دچار تنشهای شدیدی می شوند (۴،۸).

آزمایشات متعدد پژوهشکی و بررسیهای عضوی، درمانهای مختلف دارویی و عوارض جسمی و روانی آنها، طولانی بودن مدت درمان ناباروری، پائین بودن میزان موفقیت روشهای درمانی و همچنین مشکلات اقتصادی ناشی از درمان ناباروری، از عوامل تنش زای

هرگز، بندرت، گاهی اوقات، اغلب و همیشه درجه‌بندی شده‌اند.

همچنین برای تعیین چگونگی استفاده از راهبردهای متمرکز بر مسئله بین افراد نمونه، ۱۵ سوال این قسمت از نظر حداقل و حداکثر کاربرد در فاصله ۱۰-۷۵ به صورت ۱۵-۲۹ بندرت، ۴۴-۳۰ گاهی اوقات، ۴۵-۵۹ اغلب و ۶۰-۷۵ همیشه تقسیم بندی شده است و فراوانی مطلق و درصدی نمرات افراد نمونه محاسبه گردید. برای راهبردهای متمرکز بر عاطفه نیز به این ترتیب عمل

پرسشنامه‌ای با سری سوالات بسته بود که توسط پژوهشگر تهیه و اطلاعات مورد نیاز جمع‌آوری شد. عوامل تنفس زای جسمی، روانی و اجتماعی با استفاده از گزینه‌های موجود در پرسشنامه تعیین شدند. از ۳۱ سوال موجود در این بخش ۷ سوال مربوط به تعیین عوامل تنفس زای جسمی و ۲۴ سوال در رابطه با تعیین عوامل روانی-اجتماعی بود. این گزینه‌ها بر اساس مقیاس ۵ درجه‌ای لیگرت و به صورت هرگز، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد تنظیم شده‌اند. به منظور

جدول ۱- توزیع فراوانی مطلق و نسبی عوامل تنفس زای جسمی در زنان مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی الزهرا تبریز در سال ۱۳۷۷

عوامل تنفس زای جسمی	هرگز (%)	کم (%)	متوسط (%)	زیاد (%)	خیلی زیاد (%)	موردهی ندارد (%)	مجموع (%)
دردناک بودن بررسیهای تشخیصی	(۱۲) ۱۸	(۱۰/۷) ۱۶	(۱۹/۳) ۲۹	(۱۶/۷) ۲۵	(۴۱/۳) ۶۲	(۰) ۰	(۱۰۰) (۱۵۰)
معاینات دستگاه تناسلی	(۲۴/۷) ۳۷	(۳۵/۳) ۵۳	(۲۳/۳) ۳۵	(۱۳/۳) ۲۰	(۲/۷) ۴	(۰/۷) ۱	(۱۰۰) (۱۵۰)
خونگیریهای متعدد	(۴۷/۳) ۷۱	(۲۲/۷) ۳۴	(۱۴) ۲۱	(۱۳/۳) ۲۰	(۰/۷) ۱	(۲) ۳	(۱۰۰) (۱۵۰)
عارض ناشی از مصرف داروهای ناباروری	(۲۸) ۴۲	(۱۸/۷) ۲۸	(۲۰) ۳۰	(۲۵/۳) ۳۸	(۰) ۱۲	(۰) ۰	(۱۰۰) (۱۵۰)
ترربقات مکرر	(۳۰/۷) ۴۶	(۲۲) ۴۸	(۱۷/۳) ۲۶	(۱۲/۷) ۱۹	(۲) ۳	(۵/۳) ۸	(۱۰۰) (۱۵۰)
انجام جراحی	(۲/۷) ۴	(۴/۷) ۷	(۲) ۳	(۰/۷) ۱	(۰/۷) ۱	(۸۹/۳) ۱۲۴	(۱۰۰) (۱۵۰)
خستگی ناشی از رفت و آمد های مکرر به درمانگاه	(۲) ۳	(۱۳/۳) ۲	(۱۷/۳) ۲۶	(۱۸/۶) ۲۸	(۴۸/۷) ۷۴	(۰) ۰	(۱۰۰) (۱۵۰)

گردید.

برای تعیین اعتماد علمی ابزار گردآوری داده‌ها از شیوه دو نیمه کردن استفاده شد. برای این منظور در مرحله اولیه نمونه‌گیری سوالات توسط ۱۰ نفر از افراد نمونه تکمیل شد. سپس با استفاده از روش دو نیمه کردن برای سوالات بخش عوامل تنفس زا و راهبردهای مقابله‌ای ضریب پایایی با استفاده از فرمول اسپیرمن برآور بدلست آمد. به عنوان مثال برای این منظور ۳۱ سوال مربوط به عوامل تنفس زا به دو قسمت سوالات زوج و فرد تقسیم شده و ضریب همبستگی بین نمرات محاسبه و با استفاده از فرمول اسپیرمن برآور ضریب پایایی بدست آمد. این ضریب برای عوامل تنفس زا برابر ۰/۸۵ و برای راهبردهای مقابله‌ای ۰/۸۹ بود. اطلاعات جمع‌آوری شده با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد و نتایج در ۳۲ جدول منعکس گردید. از آزمون

دستیابی به هدف اول پژوهش یعنی تعیین عوامل تنفس زای جسمی، سوالات این بخش به ترتیب از نمرات ۱ تا ۵ نمره‌گذاری شد. به این ترتیب که برای پاسخهای هرگز نمره ۱، کم نمره ۲، متوسط نمره ۳، زیاد نمره ۴ و خیلی زیاد نمره ۵ منظور گردید. برای تعیین شدت عوامل تنفس زای جسمی فاصله ۷-۳۵ یعنی حداقل و حداکثر نمرات در این بخش (برای ۷ سوال) به صورت ۷-۱۳ کم، ۱۴-۲۰ متوسط، ۲۱-۲۷ زیاد و ۲۸-۳۵ خیلی زیاد تقسیم بندی شده است. فراوانی نمرات در هر قسمت محاسبه شد. به منظور دستیابی به هدف دوم پژوهش یعنی تعیین عوامل تنفس زای روانی اجتماعی و شدت آن، به روش قبلی انجام شد. به منظور دستیابی به هدف سوم پژوهش یعنی راهبردهای مقابله‌ای از مقیاس ۴۰ بیانیه‌ای جالویس استفاده شد. این مقیاس شامل ۲۵ راهبرد متمرکز بر عاطفه و ۱۵ راهبرد متمرکز بر مسئله می‌باشد که بر اساس مقیاس ۵ درجه‌ای لیگرت به ترتیب:

جدول ۲- توزیع فراوانی مطلق و نسبی عوامل تنفس زای جسمی و روانی - اجتماعی بر حسب شدت آنها در زنان نابارور مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی الزهرا تبریز در سال ۱۳۷۸

مجموع	خیلی زیاد (%)	زیاد (%)	متوسط (%)	کم (%)	شدت عوامل تنفس زا
					نوع عوامل تنفس زا
(۱۰۰) ۱۵۰	(۰/۷) ۱	(۱۴) ۲۱	(۶۶/۷) ۱۰۰	(۱۸/۶) ۲۸	جسمی
(۱۰۰) ۱۵۰	(۴/۷) ۷	(۵۲/۷) ۷۹	(۳۴/۶) ۵۲	(۸) ۱۲	روانی - اجتماعی

داخل رحمی اسپرم (IUI)^۱ در ۴۸ درصد افراد مورد پژوهش انجام شده بود.

جدول (۱) توزیع فراوانی مطلق و نسبی عوامل تنفس زای جسمی در زنان نابارور مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی الزهرا تبریز را نشان می دهد. برای تعیین بیشترین عوامل تنفس زای مجموع ستونهای زیاد و خیلی زیاد منظور شده است.

جدول فوق نشان می دهد که خستگی ناشی از رفت و

مجذور کای جهت تعیین ارتباط بین برخی مشخصات فردی و اجتماعی و عوامل تنفس زای جسمی، روانی و اجتماعی استفاده شده است.

نتایج

از مشخصات فردی - اجتماعی مواردی چون سن، میزان تحصیلات، شغل، سن همسر، میزان تحصیلات همسر، شغل همسر، سن ازدواج، طول مدت ازدواج، قومیت، محل

جدول ۳- توزیع فراوانی مطلق و نسبی چگونگی استفاده از راهبردهای مقابله ای متتمرکز بر عاطفه در زنان نابارور

درصد	فراوانی	استفاده از راهبردهای متتمرکز بر عاطفه
.	.	بندرت
۵۱/۳	۷۷	گاهی اوقات
۴۸/۷	۷۳	اغلب
.	.	همیشه
۱۰۰	۱۵۰	جمع

آمدهای مکرر به درمانگاه با ۶۷/۳ درصد بیشترین عامل تنفس زای جسمی در حد زیاد و خیلی زیاد و خونگیریهای متعدد با ۴۷/۳ درصد انتخاب گزینه "هرگز" کمترین عامل تنفس زای جسمی می باشد.

جدول (۲) توزیع فراوانی مطلق و نسبی عوامل تنفس زای جسمی بر حسب شدت آنها در زنان نابارور مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی الزهرا تبریز را نشان می دهد.

جدول فوق نشان می دهد که در بیشترین درصد از افراد مورد پژوهش (۶۶/۷٪) عوامل تنفس زای جسمی در حد

سکونت، وضعیت اقتصادی خانواده، طول مدت ناباروری، سابقه سایر بیماریها، سابقه ناباروری در بستگان درجه یک و تحت پوشش بیمه درمانی بودن بررسی شد. بر اساس نتایج، اکثریت افراد مورد مطالعه در گروه سنی ۲۵-۲۲ سال با میانگین ۲۷/۵۹ سال، خانه دار، با طول مدت ناباروری ۱-۶ سال و تحت پوشش بیمه درمانی بودند. در ۸۶/۷ درصد موارد علت ناباروری مشخص شده که از این میان ۶۵/۳ درصد مربوط به تخدمان ذکر شده بود. درمان دارویی و تلقیح

جدول ۴ - توزیع فراوانی مطلق و نسبی چگونگی استفاده از راهبردهای مقابله متمرکز بر مسئله در زنان نابارور

درصد	تعداد	استفاده از راهبردهای متمرکز بر مسئله
.	.	بندرت
۴/۶	۷	گاهی اوقات
۸۴/۷	۱۲۷	اغلب
۱۰/۷	۱۶	همیشه
۱۰۰	۱۵۰	جمع

با توجه به نتایج حاصل در اکثریت افراد مورد مطالعه، عوامل تنفس زای جسمی در حد متوسط و روانی-

متوسط تنفس زا می باشند. و در کمترین درصد افراد (۷٪) در حد خیلی زیاد تنفس زا می باشند.

جدول ۵- ارتباط بین برخی مشخصات فردی اجتماعی با شدت عوامل تنفس زا

نحوه ارتباط	ارتباط بین برخی مشخصات فردی و اجتماعی و عوامل تنفس زا
ارتباط معنی دار وجود ندارد $X^2=0/۹۷۵$, df=۴, P=۰/۳۶	ارتباط بین سن و شدت عوامل تنفس زای جسمی
ارتباط معنی دار وجود دارد . $X^2=11/۵۶۵$, df=۴, P=۰/۰۲۱	ارتباط بین سن و شدت عوامل تنفس زای روانی و اجتماعی
ارتباط طول مدت ناباروری و شدت عوامل تنفس زای جسمی $X^2=1/۳۶۵$, df=۴, P=۰/۰۸۵	ارتباط طول مدت ناباروری و شدت عوامل تنفس زای روانی و اجتماعی
ارتباط معنی دار وجود دارد . $X^2=13/۶۳۶$, df=۴, P=۰/۰۰۹	ارتباط بین طول مدت ناباروری و شدت عوامل تنفس زای روانی و اجتماعی

اجتماعی در حد زیاد تنفس زا بودند.

در ارتباط با هدف سوم پژوهش یعنی تعیین راهبردهای مقابله‌ای زنان نابارور، پس از نمره‌گذاری پاسخ، با توجه به فراوانی بیشترین راهبرد مورد استفاده پاسخ همیشه و کمترین راهبرد مورد استفاده با فراوانی پاسخ هرگز محاسبه شده است.

جدول ۳ توزیع فراوانی مطلق و نسبی چگونگی استفاده از راهبردهای مقابله‌ای متمرکز بر عاطفه در زنان نابارور را نشان می‌دهد.

جدول مذکور نشان می‌دهد که بیشترین درصد افراد مورد پژوهش (۵۱/۳٪) راهبردهای متمرکز بر عاطفه را گاهی اوقات بکار می‌برند.

جدول ۴ توزیع فراوانی مطلق و نسبی چگونگی استفاده از راهبردهای مقابله متمرکز بر مسئله در بین زنان نابارور را نشان می‌دهد.

در مورد عوامل تنفس زای روانی اجتماعی نیز نتایج بر اساس فراوانی پاسخها تعیین شد. بر این اساس نگرانی در مورد نتیجه بخش بودن درمان با (۳/۸۷٪) بیشترین عامل تنفس زای روانی اجتماعی در حد زیاد و خیلی زیاد و تحت پوشش بیمه نبودن با (۸۸٪) "هرگز" کمترین عامل تنفس زای روانی اجتماعی می‌باشد.

همچنین جدول ۲ توزیع فراوانی مطلق و نسبی عوامل تنفس زای روانی - اجتماعی را بر حسب شدت آنها نیز نشان می‌دهد.

جدول فوق نشان می‌دهد که در بیشترین درصد از افراد مورد پژوهش (۵۲/۷٪) عوامل تنفس زای روانی - اجتماعی در حد زیاد تنفس زا می‌باشند. و در کمترین درصد این افراد (۷/۴٪) در حد خیلی زیاد تنفس زا می‌باشد.

همکارانش گزارش نمودند که ۲۵٪ از زنان پس از درمان ناموفق IVF دچار افسردگی می‌شوند (۹،۱۲-۱۳).

با توجه به شواهد زیاد درباره تنش حاصل از ناباروری، محققین پیشنهاد نمودند که برنامه درمان ناباروری باید شامل یک بخش درمان روحی - روانی نیز باشد (۱۵-۱۶)، مطالعات متعدد بر روی درمان روحی - روانی برای زوجین نابارور توأم با درمانهای پژوهشی و نیز استفاده از روش‌های درمانی گروهی برای درمان این زوجین تاکید می‌کنند (۶،۱۴،۱۶).

بر اساس یافته‌های این پژوهش خستگی ناشی از رفت و آمد های مکرر به درمانگاه بیشترین عامل تنش‌زای جسمی شناخته شد. تحقیقات دیگر نیز نشان داده‌اند که رفت و آمد مکرر به درمانگاه برای بررسی و درمان ناباروری فوق العاده خسته کننده است و نظم روزانه زندگی زنان را بر هم می‌زند (۵). در اکثریت افراد مورد پژوهش، عوامل تنش‌زای جسمی در حد متوسط تنش‌زا بودند. Boivin و همکاران ۱۹۹۵ در مطالعات خود بدین نتیجه رسیدند که زنان سعی می‌کنند تنش خود را طی درمان سرکوب کنند و این به عنوان راهی برای مقابله با تنش روانی دوره انتظار برای کسب نتیجه درمان می‌باشد (۱۲).

نگرانی در مورد موفقیت نتیجه درمان، بیشترین عامل تنش‌زای روانی - اجتماعی شناخته شد. این یافته با نتایج مطالعه بولیوین و تاکمن (۱۹۹۵) مبنی بر اینکه انتظار برای نتیجه درمان و شروع قاعده‌گی به عنوان تنش‌زا ترین مراحل در درمان ناباروری منطبق می‌باشد (۱۳). به دلیل اینکه اکثریت افراد مورد مطالعه (۷۶٪) تحت پوشش خدمات بیمه درمانی قرار داشتند بنابراین تحت پوشش بیمه نبودن عامل تنش‌زای عمدت‌های برای آنها نمی‌باشد. با وجود این میزان مشکلات مربوط به هزینه درمان، بدلیل هزینه فوق العاده خدمات ناباروری بوده که اکثراً تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرد.

با توجه به جدول مذکور، بیشترین درصد افراد مورد مطالعه (۸۴٪) راهبردهای مقابله متمرکز بر مسئله را اغلب بکار می‌برند و هیچکدام از افراد مورد پژوهش آنها را بندرت بکار نبرده‌اند.

با توجه به یافته‌های پژوهش، برای دستیابی به اطلاعات بیشتر، جدول ۵، ارتباط بین برخی مشخصات فردی اجتماعی با شدت عوامل تنش‌زا تعیین شد.

بحث

برای زوجینی که خواهان فرزند می‌باشند ناباروری بصورت یک بحران با ابعاد جسمی روانی و اجتماعی می‌باشد (۱۰). Simons (۱۹۸۴) در مطالعات خود دریافت که ناباروری یک امر عینی، تهدید کننده زندگی نیست بلکه یک بحران در زندگی است که زوجین آن را در تنها یی تجربه می‌کنند (۱). مشکل ناباروری، بررسیها و درمان آن تنش‌زا بوده و ممکن است سبب اضطراب، افسردگی و اختلال جنسی شده و اثرات شدیدی در روابط زوجین داشته باشد (۹،۱).

مقالات متعددی بیان نموده‌اند که زوجین نابارور تنش ناشی از ناباروری را هم بصورت فردی و هم بصورت وابسته به یکدیگر تجربه می‌کنند. چنین تنشهایی می‌توانند منجر به مسایل روحی - روانی منفی از جمله افسردگی، تنها یی، عصبانیت، شرم‌سازی، بی‌کفاوتی و در نهایت موجبات طلاق را فراهم سازد (۵-۱۱،۶).

تنش ناباروری ممکن است برای سال‌ها پایدار بوده و تا زمانی که درمان منجر به حاملگی نشود تشدید یابد (۱۱،۶). مطالعات متعدد اختلال روان شناختی توأم با انجام لقا خارج رحمی را مورد توجه قرار داده و می‌افزایند که انجام درمان ناباروری و IVF ممکن است سبب ایجاد علائم اضطراب و افسردگی در ۵-۱۰ درصد زنان شود (۱۲،۹-۱۳). بیماران تحت درمان با IVF اغلب نگران بوده و در سیکلهای درمانی منجر به شکست اغلب دچار افسردگی و احساس از دست رفتن می‌کنند. Litt و

از بین راهبردهای متمرکز بر مسئله، قبول موقعیت، بیشترین راهبرد مورد استفاده شناخته شد. نتایج تحقیقات Davis و همکاران نیز نشان داد که بدست آوردن کنترل، دومین راهبرد مورد استفاده در زنان نابارور بوده است. صرف وقت جهت درمانهای ناباروری یکی از روشهای بدست آوردن کنترل می‌باشد. علاوه بر این در بررسی آنها نیز جستجوی معانی نهفته در ناباروری یکی از راهبردهای عمدۀ مقابله زنان نابارور بوده است. این محققین اضافه می‌کنند که بسیاری از افراد با جستجوی این معانی و در نظر گرفتن این موقعیت به عنوان خواست خداوند به آرامش می‌رسند و معتقدند اگر خداوند بخواهد و مقدر بداند سرانجام صاحب فرزند خواهدند شد (۱۸).

بطور کلی بر اساس نتایج این پژوهش زنان نابارور در معرض عوامل تنفس زای جسمی، روانی و اجتماعی ناشی از ناباروری و درمان آن قرار دارند و راهبردهای متمرکز بر عاطفه و مسئله را جهت مقابله بکار می‌برند. از این رو وجود فردی که علاقه و فرصت کافی جهت پرداختن به مشکلات عاطفی و احساسات آنها را داشته باشد در کاهش تنفس و اضطراب ایشان اثر مهمی داشته و باعث می‌شوند که درمان ناباروری حالت خوشایندی برای آنها داشته باشد.

تشکر و قدردانی

بدینوسیله از مرکز ناباروری تبریز که در جمع‌آوری اطلاعات و انجام این تحقیق به ما یاری نمودند تشکر به عمل می‌آید.

عوامل تنفس زای روانی - اجتماعی در مقایسه با عوامل تنفس زای جسمی در حد بالاتری تنفس زا بودند. Andrews و همکاران ۱۹۹۲ در مطالعات خود به این نکته اشاره دارند که اگر چه درمان ناباروری اغلب مشکل، طولانی مدت و گران بوده و شامل برخی مداخله‌های جسمی می‌باشد با وجود این، از نظر زوجین نابارور تنفس روانی و تاثیر آن در کیفیت زندگی از مسایل مهمتر آن می‌باشد (۱۷). در واقع جنبه‌های روانی ناباروری بسیار دشوارتر از انجام آزمایشات و درمان آن است (۱۷). اکثر افراد مورد پژوهش سه راهبرد متمرکز بر عاطفه، دعا کردن و توکل بر خدا، نگرانی و گریه کردن را همیشه به کار برده‌اند. میزان بالای استفاده از راهبرد دعا کردن و توکل بر خدا در افراد مورد پژوهش می‌تواند نشان دهنده زمینه اعتقادی و فرهنگی بالای این بیماران مورد مطالعه باشد.

گریه کردن نیز یکی از سه راهبرد عمدۀ مقابله‌ای در افراد مورد مطالعه بوده است. یافته‌های این تحقیق تا حدود زیادی با تحقیقات Davis و همکاران منطبق می‌باشد. در آن تحقیق درگیر احساسات شدن و از آن جمله "گریه کردن" یکی از ۴ راهبرد عمدۀ استفاده شده توسط زنان نابارور بوده است. زنان بیان کردند که آنها بسیاری از اوقات به خاطر ناباروری خود گریسته‌اند و این به عنوان تسکینی برای ایشان بوده است (۱۸).

در این مطالعه افراد تکنیکهای آرام سازی را هرگز بکار نبرده‌اند. میزان بسیار پایین استفاده از تکنیکهای آرام سازی می‌تواند به دلیل ناآشنایی افراد با این روشهای باشد.

References

- 1- Sciarra J. Infertility an international problem. J Obs Gyn. 1994; 64:155-63.

- 2- Speroff L. Clinical gynecologic endocrinology and infertility. Belti-more, MD. Williams & Wilkins. 1999.

- 3- Jonathan S., Berek E.Y., Adashi P.A. Hillard Novak's Gynecology. 1996; 915.
- 4- Hirxsch A.M., Hirsch S.M. The longer, Psychosocial Effects of infertility. J Obs Gyn Neonatal Nurs. 1995; 24(6): 517-21.
- 5- Rajvir D., Ceinwen E., Cumming D.C. Psychological Well-being and coping patterns in fertile men. Fertil Steril. 2000; 74-5, 702-6.
- 6- Mcnaughton – cassill, Bostwick M. Development of brief stress management support groups for couples undergoing *in vitro* fertilization treatment. Fertil Steril. 2000; 74-81, 87-93.
- 7- Bahamondes F. Score prognosis for the infertile couple based on historical factors and sperm analysis. J Obs Gyn. 1994; 46:311-5.
- 8- Hjelmstedt A., Andersson L., Skoog-Svanberg A., et al. Gender differences in psychological reactions to infertility among couples seeking IVF and ICSI treatment. Acta Obs Gyn Scand. 1999; 78: 42-8.
- 9- Beutel M., Kuprer J., Kirchmeyer P., et al. Treatment – related stresses and depression in couples undergoing assisted reproductive treatment by IVF or ICSI. Androl. 1999; 31:27-35.
- 10- Morrow K.A., Thoreson R.W., Penney L.L. Predictors of psychological stress among infertility clinic patients. J Consult Clin Psychol. 1995; 63:163-7.

- 11- Greenfeld D.A. Does psychological support and counseling reduce the stress experienced by couples involved in assisted reproductive technology? J Assist Reprod Genet. 1997; 14,4:186-8.
- 12- Caruso K., Dorothy A., Greenfeld M. Psychological status of *in vitro* fertilization. Patients during Pregnancy. Fertil Steril. 2000; 73(6): 1159-64.
- 13- Boivin J., Takefman J.E. Stress level across stages of *in vitro* fertilization in subsequently Pregnant and non pregnant women. Fertil Steril. 1995; 64(4): 802-81.
- 14- Seivble M. News and views: controversies in assisted reproduction. Infertility: the impact of stress, the benefit of counseling. J Assist Reprod Genet. 1997; 14: 181-3.
- 15- Domar A.D., Broome A., Zuttermeister P.C., et al. The prevalence and predictability of depression in infertile women. Fertil Steril. 1992; 58(6): 1158-63.
- 16- Strauss B., Hepp U., Staeding G., et al. Psychological characteristics of infertile couples: can they predict pregnancy and treatment persistence? J Comm Apple Soc Psychol. 1998; 8: 289-301.
- 17- Andrews F., Abbey A., Halmanl J. Is fertility problem stress different? Fertil Steril. 1992; 57(6):1947-53.
- 18- Davis D., Deraman C.N. Coping strategies of infertile women. J Obs Gyn Neonatal Nurs. 1991; 20(3): 221-8.